

ETUDE DES TERROIRS VITICOLES VAUDOIS

GEO – PEDOLOGIE

**Appellations
Bursinel, Vinzel, Luins et
Begnins**

Zone pilote de La Côte



Projet réalisé par
l'Association pour l'étude des terroirs vityoles vaudois
2000 - 2003

p.a. Prométerre – Office de conseil viticole

Av. des Jordils 3
Case postale 128
1000 Lausanne 6

Tél : 021/ 614 24 31
Fax : 021/ 614 24 04
Email : proconseil.viti@prometerre.ch

TABLE DES MATIERES

A) PARTIE GENERALE.....	3
1. INTRODUCTION	3
2. LES SOLS DU VIGNOBLE VAUDOIS : ORIGINE ET DESCRIPTION SYNTHETIQUE.....	3
2.1 <i>Un vignoble modelé par le glacier du Rhône</i>	<i>3</i>
2.2 <i>Les terroirs des régions</i>	<i>6</i>
2.3 <i>Synthèse</i>	<i>7</i>
3. NOTIONS DE GEOLOGIE ET DE PEDOLOGIE ET TERMINOLOGIE	8
3.1 <i>Rappels généraux</i>	<i>8</i>
3.2 <i>Termes de pédologie courants.....</i>	<i>8</i>
3.3 <i>Rappel des ères géologiques</i>	<i>11</i>
3.4 <i>La roche mère</i>	<i>12</i>
3.5 <i>Quelques précisions sur les noms de sols</i>	<i>14</i>
3.6 <i>L'influence de la topographie sur l'évolution des sols</i>	<i>15</i>
3.7 <i>Les propriétés hydriques des sols</i>	<i>16</i>
3.8 <i>Généralités sur l'hydromorphie</i>	<i>19</i>
4. METHODOLOGIE ET PRINCIPES DE CODIFICATION DES SOLS.....	21
4.1 <i>Méthodologie générale</i>	<i>21</i>
4.2 <i>Principes de codification des unités de sols</i>	<i>22</i>
4.3 <i>Principes de lecture des fiches de description.....</i>	<i>25</i>
Fiche de description des profils.....	25
Fiche de description des unités de sol.....	28
4.4 <i>Les limites de la représentation cartographique</i>	<i>29</i>
B) PARTIE SPECIFIQUE AU SECTEUR	30
5. TRAVAUX REALISES	30
5.1 <i>Investigations entreprises dans le secteur.....</i>	<i>30</i>
5.2 <i>Liste des profils du secteur.....</i>	<i>31</i>
6. PRESENTATION TOPOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE SIMPLIFIEE DU SECTEUR.....	32
6.1 <i>Présentation générale</i>	<i>32</i>
6.2 <i>Les principales roches mères du secteur.....</i>	<i>33</i>
Les moraines.....	34
Les dépôts glacio-lacustres	35
La molasse gréso-sableuse ou marneuse.....	35
Les colluvions.....	35
7. LES UNITES DE SOLS DU SECTEUR	36
7.1 <i>Sols issus de moraines latérales caillouteuses peu compactes</i>	<i>36</i>
Unités 2113, 2114 (fiche 2113).....	38
Unité 2115 (fiche 2115).....	39
Unités 2125, 2124 (fiche 2125).....	40
Unités 2135, 2136 (fiche 2136).....	41
Unité 3115 (fiche 3113).....	42
7.2 <i>Sols issus de moraines de fond</i>	<i>43</i>
Unités 2413, 2414 (fiche 2413,1).....	44
Unité 2415 (fiche 2415).....	45
Unités 2435, 2434 (fiche 2435).....	46
7.3 <i>Sols issus de dépôts sablo-caillouteux meubles</i>	<i>47</i>
Unités 2716-2715, 2710 (fiche 2716)	49
Unité 2736 (fiche 2736).....	50
Unité 2315 (fiche 2315).....	51
7.4 <i>Sols issus de colluvions de bas de pente</i>	<i>52</i>
Unités 9116, 9216 (fiche 9116).....	53
Unités 9236.1, 9136, 9136.2 (fiche 9136).....	54
7.5 <i>Répartition des sols du secteur.....</i>	<i>55</i>
8. LE COMPORTEMENT HYDRIQUE DES SOLS DU SECTEUR.....	56
8.1 <i>Les principaux profils hydriques des sols du secteur.....</i>	<i>56</i>

8.2	<i>La réserve hydrique des sols du secteur</i>	60
9.	CONCLUSIONS	63
10.	GLOSSAIRE ET BIBLIOGRAPHIE	64
10.1	<i>Glossaire des noms de sols</i>	64
10.2	<i>Abréviations des horizons utilisées dans les fiches de description</i>	66
10.3	<i>Lexique</i>	67
10.4	<i>Bibliographie</i>	71
11.	ANNEXES	72
	Annexe 1 : Fiches de description des profils de sols.....	72
	Annexe 2 : Analyses de terre Sol-Conseil.....	95
	Annexe 3 : Représentation schématique de quelques sols.....	96
	Annexe 4 : Quelques profils hydriques	97
	Annexe 5 : Méthodologie de calcul de la réserve hydrique.....	98
	Annexe 6 : Carte des sols grand format	102

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Figure 1 :	Schéma de la mise en place des différentes roches mères du canton de Vaud.....	5
Figure 2 :	Echelle stratigraphique des temps géologiques.....	11
Figure 3 :	Schéma de l'influence d'une toposéquence type.....	15
Figure 4 :	Schéma des grands types de sols hydromorphes.....	20
Figure 5 :	Fiche de description des profils	25
Figure 6 :	Diagramme de texture du GEPPA, 1963.....	26
Figure 7 :	Fiche de description des unités de sols.....	28
Figure 8 :	Coupe géologique simplifiée - zone pilote de La Côte.....	33
Figure 9 :	Coupe schématique d'un glacier	34
Figure 10 :	Principales propriétés des matériaux glaciaires.....	35
Figure 11 :	Affleurement de moraine caillouteuse.....	36
Figure 12 :	Surfaces et pourcentages de répartition des sols par code sur le secteur	55
Figure 13 :	Proportion d'hydromorphie	55
Figure 14 :	Répartition des sols en fonction de leur réserve utilisable et de leur profondeur d'enracinement..	59
Figure 15 :	Calcul de la réserve utile	60
Figure 16 :	Répartition des réserves hydriques en % de la surface du secteur.....	61
Figure 17 :	Carte des réserves hydriques des sols du secteur	62

A) PARTIE GENERALE

1. INTRODUCTION

En perpétuelle évolution, le monde viticole n'a de cesse de rechercher et de tester les techniques et les procédés les mieux adaptés à son vignoble. L'influence du milieu naturel sur la qualité et la typicité des vins est aujourd'hui largement reconnue. Il n'est cependant pas facile de comprendre quelles sont les influences de chacune des composantes naturelles du terroir (sols, géologie, climats, expositions, pentes) sur le comportement de la vigne.

Ce travail s'inscrit dans le cadre général de l'Etude des terroirs viticoles vaudois, initiée en 2000 par l'Association pour l'étude des terroirs viticoles vaudois, coordonnée par Prométerre et réalisée en collaboration avec la Station fédérale de recherches en production végétale de Changins, l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et le Service des eaux, sols et assainissement de l'Etat de Vaud. Le laboratoire Sol-Conseil de Changins a réalisé les déterminations analytiques.

Dans un premier temps, quatre zones pilotes ont été étudiées pour la mise au point des méthodes et outils. Les résultats ont ensuite été appliqués à l'ensemble du vignoble vaudois.

L'étude pédologique vaudoise a été réalisée sur la base de 1'400 sondages à la tarière, 300 profils et plus de 60 réunions autour des cartes et profils. La participation des vigneron de plus en plus soutenue au fil du temps nous a aidés à construire un outil de référence adapté aux questions viticoles.

Cette étude s'efforce de donner une image précise du sol, surtout dans sa partie profonde, en insistant tout particulièrement sur ses propriétés hydriques. Les cartes ont été validées et précisées par les viticulteurs.

Nous avons utilisé un vocabulaire simple et commun. Les termes techniques indispensables employés dans les descriptions sont définis dans le glossaire.

2. LES SOLS DU VIGNOBLE VAUDOIS : ORIGINE ET DESCRIPTION SYNTHETIQUE

2.1 UN VIGNOBLE MODELÉ PAR LE GLACIER DU RHÔNE

La toute dernière glaciation (Würm) voit défiler sur le canton une langue de glace d'un kilomètre d'épaisseur, qui ne s'est retirée que depuis 12'000 ans. Le rôle du glacier du Rhône est fondamental par son empreinte - il a modelé l'ensemble du vignoble vaudois - et bien sûr par ses dépôts de moraines - 62 % des surfaces en vigne dérivent directement de dépôts glaciaires. Selon les roches et les reliefs que le glacier a chevauchés, il a eu un rôle soit :

- **de dépôt assez épais de moraines** : l'influence du sous-sol disparaît, les nuances morainiques prennent toute leur importance;
- **de rabotage complet** : c'est alors la roche ancienne qui va être directement à l'origine des séries de sol. Cette roche est dans 80 % des cas la molasse tertiaire du bassin vaudois.
- Entre ces deux extrêmes se rencontrent les cas de dépôts d'épaisseur modeste où la surface est semblable à celle des dépôts morainiques, mais où les racines plongent dans la molasse

marneuse ou dure, les calcaires jurassiens ou les calcaires triasiques et gypseux. Enfin, les dépôts glaciaires peuvent être eux-mêmes recouverts par des éboulis gravitaires encore plus récents, voire des colluvions de bas de pente ou des alluvions.

Les terroirs des formations glaciaires : les moraines

Les paysages et les sols des vignobles de montagne qui ont vécu une histoire glaciaire présentent bon nombre de singularités :

- **Une conjoncture particulière** : les moraines latérales permettent une combinaison très favorable à la viticulture; elles associent des sols très caillouteux, profonds à des pentes fortes (souvent aménagées en terrasses) qui optimisent l'interception du rayonnement énergétique.
- **Une minéralité des sols** : jeunes (moins de 10'000 ans) et en pente, les sols de moraines sont encore peu évolués. Les niveaux organiques n'excèdent souvent pas les 60 premiers cm, ce qui permet aux racines d'évoluer dans l'ambiance minérale de la roche mère.
- **Un équilibre minéralogique des sols** : les éléments constitutifs de la moraine proviennent de l'érosion des roches encaissantes de tout le bassin versant du Rhône depuis le haut cirque glaciaire. On retrouve des éléments granitiques, schisteux, gneissiques, calcaires noyés dans une farine glaciaire silteuse calcaire. Cette cohabitation d'éléments siliceux et calcaires ne peut se rencontrer, en situation de coteaux, que dans un contexte glaciaire récent (et donc dans les vignobles de montagne). Les moraines rhodaniennes contiennent la majeure partie des éléments qui constituent la surface de la terre. L'altération lente de ces minéraux très variés doit conférer un équilibre particulier à l'alimentation de la vigne.
- **Des moraines récentes mais parfois très compactes** : le glacier du Rhône fut au cours des dernières glaciations l'un des plus puissants glaciers des Alpes. Il a pétri et compacté les dépôts qui se trouvaient sous la glace. Ces dépôts, dits "moraines de fond", ont subi des pressions allant jusqu'à 800 t/m² à l'état sub-saturé et demeurent ainsi impénétrables par les eaux et par les racines de vigne qui s'efforcent d'en altérer la surface. De telles compacités ne sont jamais rencontrées dans les autres formations superficielles récentes.

Les terroirs des roches anciennes : les molasses et les calcaires anciens

Le terme de molasse désigne des roches mises en place à l'ère tertiaire en périphérie des jeunes reliefs alpins. Selon leur mode de dépôts, les molasses seront des roches toujours calcaires mais de grain et de consolidation très différents : dans le vignoble vaudois, ce sont des marnes, des marnes gréseuses, des grès massifs, des poudingues ou des sables gréseux. Ces roches, vieilles de 15 à 35 millions d'années, supportent 14 % des sols viticoles du canton. Selon les faciès, les sols seront argileux, sableux ou caillouteux, très profonds ou rendus superficiels par la présence d'un banc rocheux ou de la marne brute compacte. D'autres calcaires, beaucoup plus anciens, interviennent à l'ouest du lac de Neuchâtel et dans le Chablais.

Les terroirs de couverture : les éboulis, les alluvions et les colluvions

Les éboulis du Chablais proviennent des falaises calcaires dominantes, qui, depuis la fin des glaciations (12'000 ans), se fragmentent et épandent (parfois brutalement) des gravettes caillouteuses jusqu'au bas des versants. Les colluvions - dépôts fins de bas de pente - et les alluvions récentes représentent 17 % des sols du canton.




Figure 1 : Schéma de la mise en place des différentes roches mères du canton de Vaud

2.2 LES TERROIRS DES RÉGIONS

Les terroirs du Chablais : originalité et diversité

Les moraines du Chablais sont dans l'ensemble assez caillouteuses avec une dominante d'éléments calcaires.

Les 42 ha de la colline de Chiètres demeurent une particularité et un mystère puisque la présence du flysch n'y est pas encore totalement expliquée.

Les sols sur gypse (53 ha) d'Ollon et de Bex, plaqués sur des pentes très fortes souvent convexes, sont parmi les moins profonds et les plus particuliers du canton du point de vue de leur chimisme.

Sur Aigle, Yvorne et Villeneuve, les sols issus d'éboulis (155 ha) sont profonds, toujours très caillouteux. Ils contiennent 50 % à 90 % d'éclats calcaires emballés dans une matrice plutôt argileuse, ce qui les distingue des dépôts fluvio-glaciaires lavés, gravelo-sableux.

Les sols du Chablais sont également parmi les plus drainants du canton.

Les terroirs de Lavaux : une palette complexe de moraines sur molasse

La succession de formations molassiques de duretés différentes, articulées de part et d'autre de l'épaulement de poudingue du Mont-Pèlerin a engendré plusieurs changements de comportement du glacier depuis Montreux jusqu'à Lausanne :

- érosif, il dégage les marnes rouges, typiques de Montreux;
- bloquées par l'épaulement de Rivaz, ses moraines latérales caillouteuses beurent les corniches structurales de grès et de poudingue molassique de Chardonne à Rivaz;
- le glacier retrouve un rôle érosif en aval du Dézaley (constitué de marno-grès abrités des dépôts de moraine par l'épaulement de Rivaz). Il dégage les molasses argileuses glissées sur les pentes de Calamin, puis marno-gréseuses un peu plus armées d'Epesses à Lutry. Des placages résiduels de moraine de fond et de moraines sablo-graveleuses combinés à l'aménagement spectaculaire des terrasses compliquent la répartition des sols.

Les terroirs de la Côte : la prédominance des moraines de fond

La moraine de fond imprime son caractère à la majeure partie des coteaux allant de Morges à Nyon. La profondeur et le taux de calcaire des sols qui en sont issus sont dictés par l'inclinaison des pentes. Ces sols compacts en profondeur côtoient des sols parfois très caillouteux : chapeau de moraine de retrait ou tracés de cônes de déjection glacio-torrentiels. La moraine compacte dirige les écoulements d'eau de sub-surface au travers du vignoble. C'est sur les hauts des coteaux ou à proximité des ruisseaux que la moraine, moins épaisse, laisse place à la molasse marneuse plus argileuse.

Des sols plus évolués développés sur les cônes de déjection de Mont-sur-Rolle et du Coteau de Vincy se démarquent nettement de l'ambiance toujours calcaire des moraines. Dans le sol, des fantômes de cailloux granitiques totalement altérés par l'acidité s'emballent progressivement d'argiles rouges néoformées qui enrichissent les graves sableuses initiales constituant le sous-sol.

Les terroirs du Nord vaudois : des moraines, des molasses légères et des calcaires durs du Jura

Les Côtes-de-l'Orbe ont subi l'influence morphologique des glaciers, mais les dépôts en sont peu conservés : quelques chapeaux sablo-caillouteux de moraines dominant des pentes aux sols issus de molasses en séquences complexes, marno-gréso-sableuses, diversement colorées. Le secteur de Bonvillars possède un peu plus de 30 ha de sols peu profonds limités par des dalles de calcaire jaune parallèles à la pente. La gestion des réserves hydriques limitées et superficielles et la sensibilité aux millésimes y sont très particulières. Le reste des sols du vignoble est issu de moraines diversement caillouteuses et compactes.

Sur le Vully, la molasse est dominante; plus sableuse que dans le sud, elle est irrégulièrement consolidée, minérale mais accueillante aux racines. Ce «rocher de chien» des vigneron occupe plus de 70 % des surfaces en pentes souvent très fortes. La molasse marneuse rougeâtre détermine le reste des sols.

2.3 SYNTHÈSE

Sur ce canevas tressé à partir de la géologie, plus de 300 types de sols ont été caractérisés (une même roche peut donner plusieurs types de sols bien différents). Une vingtaine représente 50 % des surfaces. 80 % des sols font plus d'1 m de profondeur, mais possèdent des réserves en eau très différentes selon les cas (de 50 à 350 mm de réserve en eau utilisable par la vigne). Une grande diversité de situations d'équilibre entre offre et demande hydrique peut être observée, ce qui implique une forte influence des choix cultureux (adaptation à la demande, choix du matériel végétal) même si les bilans hydriques climatiques calculés ne font pas apparaître de longues périodes de déficit.

Cette complexité apparente ne doit pas cacher l'essentiel : sur chacun de ces sols, des vins de qualité parfois exceptionnelle peuvent être produits, moyennant des pratiques culturelles évidemment différentes.

Ces choix ne peuvent pas être réglés finement de façon autoritaire : le rôle des vigneron est plus que jamais central et leur formation et leur sensibilisation à cette approche absolument nécessaires.

3. NOTIONS DE GEOLOGIE ET DE PEDOLOGIE ET TERMINOLOGIE

3.1 RAPPELS GÉNÉRAUX

Le sol est la couche de liaison entre la roche brute (étudiée par la géologie et connue en Suisse par les cartes géologiques de l'Atlas géologique du Service Hydrologique et Géologique National) et l'atmosphère: il est en général constitué d'**horizons** superposés dont l'ensemble constitue le **profil** (visible dans une **fosse**).

C'est un milieu d'accueil pour les racines des végétaux. Ce milieu est complexe et en équilibre parfois fragile avec son environnement. Il résulte de plusieurs milliers d'années d'évolution :

- sous une végétation naturelle qui le fragmente physiquement par ses racines et lui fournit la matière organique. Celle-ci, après action de la microflore et microfaune (activité biologique), engendrera l'humus, caractéristique des horizons supérieurs des sols et dont la minéralisation est, en sols naturels, la principale source d'alimentation azotée des plantes.
- et sous un (ou plusieurs) climat(s) qui détermine(nt) des conditions d'humidité et de température dans lesquelles les réactions chimiques entre les minéraux, la matière organique et l'eau vont se dérouler.

L'analyse de terre donne des renseignements apparemment précis sur les proportions des constituants et la disponibilité des éléments théoriquement utilisables par la plante. L'abondance de chiffres obtenue fait qu'il est tentant de les utiliser statistiquement. En pratique, de très nombreuses raisons font qu'elle ne remplace pas du tout l'observation du sol en place qui est un système global. Il faut éviter de se polariser sur des détails ou des facteurs secondaires, relativiser la valeur des analyses de laboratoire et les replacer dans le contexte de la parcelle.

La vigne possède une capacité impressionnante à coloniser toutes les couches pénétrables et les fissures, pour peu qu'elles ne soient pas trop durablement asphyxiantes. En zone méditerranéenne, et en l'absence fréquente de précipitations estivales notables pendant 3 mois ou plus, la contribution des couches les plus profondes est essentielle pour le déroulement des processus de maturation. On sait aujourd'hui que même en l'absence de stress visible sur la plante, des modifications physiologiques à forte incidence sur la qualité des produits finaux, incidence différente selon les contextes, sont explicables par les niveaux de contraintes hydriques atteints dans le sol.

Quand la roche elle-même est explorée par les racines (roche fissurée ou à couches de marnes par exemple), il faut essayer de l'intégrer à la description du profil.

3.2 TERMES DE PÉDOLOGIE COURANTS

Texture - composition minéralogique - structure

Un sol est décrit par ses constituants : leur taille (texture) et leur nature chimique (ou composition minéralogique), puis par la façon dont ces constituants sont arrangés entre eux (structure), ce qui ne peut se voir que sur le profil en place. Le fonctionnement peut être en partie déduit de la combinaison de ces descriptions complémentaires (réserves minérales, hydriques, aération, drainage, etc.).

Image: avec une même quantité de poutrelles métalliques et de boulons, on peut construire une tour très solide, une tour instable, au pire un tas compact sans vides.

Matières organiques, argile, oxydes de fer et calcium sont les boulons et les ciments qui permettent de solidifier les structures des sols. Un sable fin, pur et blanc, est sensible à la simple érosion par le vent. **La texture** ou **granulométrie** est l'appréciation au toucher que l'on peut porter sur la répartition par catégorie de grosseur des constituants du sol, quelle que soit leur nature chimique.

On pratique l'**analyse granulométrique** en laboratoire sur la terre fine tamisée à 2 mm, après destruction des liants (matière organique, etc.) et broyage doux ou tamisage forcé des petits agrégats. Le broyage est délicat car de petites mottes très argileuses et sèches sont parfois aussi résistantes que certains graviers (schiste ou calcaire marneux fragile par exemple).

Quand nous parlons de limons, il ne s'agit pas obligatoirement de bons limons de rivières, mais de particules de taille comprise 2 et 50 microns ou μ . Leur dominance donne des terres douces, ni argileuses (non plastique et non gonflante) ni sableuses.

Une fois la proportion des différentes tailles de constituants connue, on peut situer l'échantillon sur un graphe triangulaire (argile /limon) sur lequel sont délimitées les classes texturales (sable, limon argileux, etc.) pour mieux comparer les échantillons entre eux.

Les grains de matière constituant le sol analysé peuvent être de toute nature (ce sont des minéraux comme les carbonates, quartz, micas, argiles ou des oxydes de métaux). Les cailloux, graviers, sables et limons grossiers sont assez passifs du point de vue chimique mais conditionnent la circulation de l'eau dans le sol. L'argile et pour une part les limons fins (2 à 20 μ) sont beaucoup plus réactifs chimiquement.

Quelques paradoxes de vocabulaire

Les textures sableuses sont souvent dites "**grossières**" (le sable est "gros" par rapport aux argiles) mais sont aussi les plus "**légères**" c'est-à-dire faciles à travailler. Les textures les plus "**fin**s" (argileuses) sont aussi les plus "**lourdes**" car difficiles à travailler.

L'argile

La **fraction de terre la plus fine** est tout à fait importante. D'elle dépendent en grande partie la fertilité, la stabilité, la réserve en eau du sol. Ses propriétés sont très différentes de celles des fractions plus grossières car la fraction fine est en grande partie composée d'argile, minéral très particulier disposé en feuillets visibles seulement au microscope électronique, pouvant gonfler en présence d'eau, retenir les cations nutritifs (K^+ , Mg^{++} , Ca^{++}) et les échanger avec l'eau du sol (et donc les racines). Les limons fins ont également un pouvoir de fixation lorsqu'ils sont complexés avec l'humus par du fer; mais ce pouvoir reste nettement plus faible que celui de l'argile car la fixation ne se fait qu'à la surface de particules pleines. Ce pouvoir de fixation est bien mesuré en laboratoire par la CEC (Capacité d'Echange des Cations), qui représente la quantité maximale de cations que peut fixer le sol. Cette CEC provient essentiellement des argiles vraies, de l'humus et un peu des limons fins. Quand on connaît le taux de matière organique, il est donc possible d'estimer grossièrement la qualité des argiles (CEC de la fraction minérale).

Cette grande activité chimique et physique fait que le rôle de l'argile est dominant dans le sol. Une composition de 33-33-33 pour chaque fraction donne un sol déjà bien lourd d'argile limono-sableuse (Als). Un sol est dit "argilo-sableux" (AS) dès que sa terre fine contient plus de 20 % de particules de taille inférieure à 0.002 mm (2 microns), et la racine "argilo" (exemple sablo-argilo-limoneux Sal) apparaît dans la dénomination de la texture dès que le taux d'argile dépasse 10 %, ce qui montre l'importance de cette fraction. 45 % d'argiles masquent les autres fractions : le sol est argileux (A).

Attention: toutes les argiles ne sont pas équivalentes.

Certaines sont peu gonflantes, peu "riches" comme les kaolinites (terres à poterie). Elles ont alors une faible CEC. D'autres sont au contraire très auto-fissurantes et à très forte CEC comme les montmorillonites, fréquentes dans les terres noires d'anciennes zones mal drainées. Les argiles des sols rouges (FERSIALSOLS), très liées au fer ferrique, confèrent au sol une structure micro-polyédrique particulièrement solide.

L'optimum cultural au niveau de la texture est évidemment la terre franche : 25 % d'argile, 30-35 % de limons et 40-45 % de sables, car elle présente la plupart des qualités des sols plus typés sans en avoir les inconvénients. Mais cet optimum est surtout valable pour les cultures annuelles, qui nécessitent chaque année une bonne préparation de sol et surtout n'explorent que les couches les plus superficielles du sol. La vigne quant à elle s'adapte aux situations texturales les plus variées et l'on trouve les vignobles les plus prestigieux sur des sols de textures totalement différentes.

Les sols peu argileux (moins de 10-15 % d'argile) peuvent subir des dommages par tassement superficiel lors du passage des engins car leur structure ne peut se restaurer par la fissuration naturelle. La fermeture de la porosité qui résulte du tassement peut accentuer les phénomènes de ruissellement en situation de pente (stockage de l'eau moins efficace et tendance à l'érosion, "fatigue" de certains types de sols menés en non culture intégrale). La sensibilité au tassement semble maximale pour certaines compositions granulométriques de mélanges où les particules s'imbriquent les unes avec les autres (Limon sablo-argileux - Lsa).

3.3 RAPPEL DES ÈRES GÉOLOGIQUES




Figure 2 : Echelle stratigraphique des temps géologiques

3.4 LA ROCHE MÈRE

Pour le pédologue, la roche mère est le matériau dont l'altération par les agents physiques, biologiques et chimiques explique le développement du sol qui la recouvre. Ce peut être une roche consolidée (calcaire, grès, granite) ou meuble (loess, marne, sable, alluvions, moraine, pélite...).

Souvent, les sols ne dérivent pas de la roche qui est située à plus ou moins grande profondeur sous eux: vent, rivières, glissements de terrains, éboulis ont pu rapporter des matériaux sans rapport avec la roche ancienne en place. Le sol dérive de ces apports qui deviennent une nouvelle roche mère (dite formation superficielle).

Parmi ces sols d'apports, il est souvent utile de distinguer les apports anciens, souvent caillouteux et évolués (âgés de -12'000 ans à -1 million d'années en gros) des apports récents (de - 12'000 à nos jours) formés sous un climat semblable au nôtre. La plupart du temps, les apports les plus récents se trouvent confinés dans les zones les plus basses (vallées de rivières, plaines) ou dans les zones basses relativement aux reliefs environnants (cuvettes plus ou moins perchées). Il faut fortement nuancer cette observation en zone de montagne: les moraines récentes et éboulis moins que millénaires peuvent être épandus en zones fortement pentues.

Les apports anciens sont rarement situés en fond de relief, car le surcreusement des vallées a continué depuis leur dépôt. Ils sont souvent caillouteux et évolués, car ils ont connu des épisodes climatiques (glaciaires, périglaciaires, interglaciaires chauds et humides) très contrastés, parfois violents. Ils peuvent être eux-mêmes masqués par des recouvrements plus récents de quelques décimètres.

Nous limitons l'emploi du terme colluvial ou de la référence COLLUVIOSOL aux zones vraiment basses (en relatif ou en absolu) et très peu pentues du relief car si l'on incluait tous les remaniements ou épaissement de pente sous ces vocables, ils prendraient trop d'importance spatiale au détriment d'autres informations d'origine ou d'évolution.

Quelques roches mères courantes

Roches calcaires : ces roches se sont déposées pour la plupart en milieu aquatique (mer ou lac) et sont constituées de boues calcaires plus ou moins consolidées, de coquilles ou de fragments de coquilles, qui ont ainsi progressivement fixé et immobilisé le gaz carbonique surabondant dans l'atmosphère de notre planète dans les temps géologiques les plus anciens. Elles sont souvent claires et disposées en strates (bancs).

Elles contiennent du carbonate de calcium (CaCO_3 , appelé souvent aussi calcaire) en proportion dominante. Ce minéral soluble dans les eaux légèrement acides confère aux sols des propriétés très particulières. La classification des roches calcaires est très complexe.

Calcaires purs et durs : composés de plus de 80 % de carbonates de calcium et très résistants. Quand les bancs dépassent 40-50 cm d'épaisseur moyenne, le sol n'est pas défrichable; mais si le calcaire est disposé en couches décimétriques ou centimétriques ou bien très obliques et pour peu que la topographie soit favorable, le sol devient défrichable. Un tel calcaire s'altère très lentement et donne sous climat de type méditerranéen un résidu pelliculaire autour des cailloux et dans les fissures, souvent argileux et rouge, peu ou très peu calcaire. Plus la densité de fissures ou de plans de stratification entre les bancs est abondante, plus les strates sont obliques par rapport à la surface et plus le résidu argileux d'altération est abondant et susceptible de fournir une quantité de terre notable. De tels sols ont pu se former par le passé dans des zones qui sont actuellement sorties du climat méditerranéen.

Calcaires purs mais tendres : ce sont les craies, poreuses et friables, qui donnent des sols particuliers très riches en calcaire actif, qui sont le siège d'intenses transferts hydriques par capillarité. Le terme italien Gesso, se déclinant en Gy dans le Chablais, est utilisé pour désigner une roche friable et tendre, très blanche mais se rapporte parfois à un calcaire crayeux, parfois au gypse vrai.

Calcaires marneux / calcaire argileux (5 à 35 % d'argile) : ils sont intermédiaires entre les calcaires et les marnes tendres. Ils peuvent gonfler par hydratation des argiles qu'ils contiennent. Ce ne sont donc pas de très bonnes pierres de construction.

Calcaires gréseux : riches en grains de quartz ou de calcite, ils font effervescence à l'acide mais sont rugueux au toucher.

Marnes : roche tendre, riche en argile (35 à 65 %) et en carbonate de calcium, lisse au toucher, faisant effervescence à l'acide chlorhydrique dilué, plastique à l'état humide, parfois dure mais rayable à l'ongle à l'état sec. Les marnes peuvent être d'aspect terreux ou bien compactées en plaquettes ou cubiques et massives. Elles prennent des couleurs variées: blanc, beige, bleuté, saumoné ou rouge. Ce peuvent être les pires ou les meilleures des roches mères selon leur compacité initiale et la qualité des argiles qu'elles contiennent. Les agriculteurs parlent parfois d'«argiles» à leur sujet. Dans les paysages calcaires, ce sont elles qui donnent les sols le plus facilement cultivables, répartis sur des coteaux aux formes douces, les points hauts des reliefs étant armés par des calcaires durs. En situation de pente plus forte ou quand elles sont compressées et feuilletées, elles sont imperméables et sensibles à l'érosion, mal protégées par la végétation, et donnent les paysages ravinés, parfois pittoresques, mais souvent désolés de "bad-lands". Si elles sont peu feuilletées, mais fissurées, elles sont cause de glissements de terrain en loupes, localisés ou parfois plus importants.

Marno-calcaires : formation où alternent des bancs marneux et calcaires. Leur comportement est très variable suivant l'inclinaison, l'épaisseur et la fragmentation des bancs durs : certaines formations qui semblent extrêmement rocheuses ont un excellent comportement hydrique.

Loess : dépôts bien triés limono-sablo-argileux d'origine éolienne, non compactés et très poreux, battants en surface. Leur origine est variable : loess de proximité ou loess glaciaires, ce qui explique les variations de composition et de teneur en calcaire. Mais leur mode de dépôt commun (transport par le vent) leur confère une excellente porosité et une facilité de travail. Les grandes migrations des peuplades d'agriculteurs ont souvent suivi les dépôts de loess. Si, à l'origine, ce matériau était le plus souvent calcaire, l'action de la pluie a entraîné une décarbonatation progressive des horizons de surface, avec redistribution de ce calcaire dissout en profondeur (60-80 cm) soit sous forme d'accumulation diffuse, soit mieux matérialisée en agglomérats durs et blanchâtres de 2 à 10 cm, globuleux, très typiques (et dénommés "poupées" de loess par les géologues). L'évolution par lessivage des sols de loess est beaucoup plus complète lorsque l'on passe à des climats plus humides ou montagnards.

Attention aux termes de grès, gresses, grèzes

Grès : en géologie, ce terme représente une roche massive consolidée et constituée de grains sableux (de quartz souvent) réunis par un ciment (calcaire ou non). Certains grès calcaires en plaques ont un très bon comportement hydrique, d'autres sont très massifs et donnent des sols séchant, sableux et très minces.

Grèze : ce terme représente en France une formation caillouteuse de pente. Les cailloux sont anguleux et proviennent de l'éclatement par le gel des roches dures environnantes (équivalent: gravettes). Les agriculteurs de langue d'Oc parlent parfois de "**gresses**" ce qui occasionne de fréquents malentendus avec le grès géologique qui est une roche massive. Les "Grès" des Côtes du Rhône correspondent par contre presque toujours aux sols anciens couverts de gros galets rhodaniens particulièrement typiques de la région de Châteauneuf-du-Pape. Dans de tels cas, il faut anticiper de probables confusions.

Molasse : en géologie, la molasse est une formation et non une roche unique qui s'est déposée à la fin de la création des chaînes de montagne (oligocène ou miocène du pourtour de l'arc alpin). Une intense érosion des reliefs jeunes émergés se produit, ce qui fournit un matériau meuble en quantités énormes. Ce matériau va s'accumuler en couches épaisses à faible distance des reliefs. Les couches ne sont pas toutes de même composition et on retrouve des couches de marnes souvent gréseuses, de grès, de calcaire lacustre... Par simplification on parle parfois de molasse pour décrire les bancs les plus durs de la molasse locale (calcaire gréseux jaune du miocène en Provence ou Languedoc, de l'oligocène en Aquitaine, grès de l'oligocène ou du miocène en Suisse, etc.). De très célèbres vignobles sont installés sur des molasses d'origine alpine ou pyrénéenne.

Moraine : éléments de toutes tailles, arrachés, éboulés ou déposés sur et sous un glacier, puis transportés ou compactés par lui. Dépôts constitués par ces éléments: moraines latérales, de fond, frontales... Chaque moraine a son histoire et il faut en préciser la composition (calcaire, etc.).

Quartzite : roche sédimentaire très dure constituée de sables quartzeux jointifs parfois ferrifères. Ce sont les galets de quartzites qui subsistent le plus longtemps dans les sols des terrasses alluviales très anciennes du Rhône (villafanchien) caractéristiques de certains vignobles de Côtes du Rhône, alors qu'ils ne représentent qu'un faible pourcentage des éléments grossiers de la moraine rhodanienne qui a donné naissance à toutes ces alluvions.

3.5 QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES NOMS DE SOLS

Le terme de calcaire (roche, minéral ou simplement présence de carbonate de calcium) est des plus imprécis. Excès, présence ou déficit en carbonate de calcium impliquent deux mondes de sols très différents. Pour ne rien éclaircir, les amendements calcaires sont devenus amendements calciques, alors qu'un horizon calcique ne présente justement plus de carbonates, tout en restant saturé en calcium.

Sols ou horizons calcaires (voir CALCOSOLS ou RENDOSOLS) : en toute rigueur on devrait parler de sols carbonatés (à carbonates de calcium CaCO_3). Ce qui les caractérise est la présence de particules calcaires dans la terre fine tamisée. La terre fine fait donc effervescence à l'acide chlorhydrique dilué. Leur taux de calcaire "total" à l'analyse est supérieur à 5 %.

Sables, graviers et cailloux forment le calcaire "inactif". Plus ce calcaire est finement divisé (taille des grains de calcaire proche ou inférieure à celle des limons), plus il est actif chimiquement et peut libérer des ions calcium en abondance dans la solution du sol (eau du sol). Une fraction calcaire présente dans la terre fine empêche tout risque d'acidification et de lessivage de l'argile (appauvrissement de surface) car les acides du sol (acide carbonique de la respiration, acides organiques) ne manquent pas pour attaquer ce calcaire et maintenir un complexe bien garni, largement saturé.

Sols ou horizons calciques (voir CALCISOLS ou RENDISOLS): il n'y a plus d'effervescence à l'acide (plus de grains calcaires) mais encore suffisamment de calcium pour que le pH reste neutre sans risque d'acidification immédiat. Le complexe d'échange reste voisin de la saturation, mais la structure de surface du sol peut déjà être plus fragile. Ces sols sont d'anciens sols calcaires qui se sont décarbonatés sous l'action des pluies, de la végétation. Ils sont rares en zone méditerranéenne de pluviométrie inférieure à 600-700 mm, car le lessivage du calcium n'est pas assez important (bilan pluviométrie / évaporation déficitaire). Seuls quelques sols de replat et très perméables (de sables ou de cailloutis calcaires par exemple) montrent cette évolution. Sous climat plus arrosé, ils se développent rapidement dès que la pente s'adoucit et l'on en trouve déjà sur les sols jeunes de moraine, peu calcaires au départ il est vrai, et qui ont moins de 10'000 ans.

Sols à accumulation calcaire (calcariques) : fréquents dans les pentes de marnes, ces sols possèdent un horizon intermédiaire enrichi en calcaire fin (simplement plus clair, à taches blanches farineuses ou à globules durs et blancs). Le taux de calcaire actif peut faire un bond dans cet horizon mais il n'y a pas de cimentation physiquement gênante. La dynamique complexe de la chlorose est en général favorisée par des différences de perméabilité lorsque ces signes apparaissent dans le sol.

Sols à encroûtements calcaires (pétrocalcariques) : les termes locaux sont variés et évocateurs : croûte - sistre - taparas - carnève - tuf,... On parle d'encroûtement calcaire quand un horizon (souvent entre 60 et 100 cm) montre une cimentation des cailloux par un ciment calcaire. Sous l'encroûtement, le sol peut redevenir pénétrable. Cet "entartrage" du sol s'est fait progressivement (en tout cas pas en moins d'un siècle, ce qui en exclut la reformation pendant la vie d'une vigne sauf cas très particuliers) sous climat chaud à période sèche marquée, et dans les matériaux plutôt perméables, caillouteux et calcaires.

Suivant les cas, ce peut être un simple durcissement sur quelques centimètres ou une véritable dalle de béton de plusieurs décimètres (occurrence très rare dans le canton).

3.6 L'INFLUENCE DE LA TOPOGRAPHIE SUR L'ÉVOLUTION DES SOLS

L'évolution d'un sol (approfondissement, décarbonatation sur roche calcaire, différenciation en horizons) dépend de la stabilité de sa position : érosion et perte d'éléments sur les pentes fortes, stabilité sur les replats et les pentes faibles, accumulations de terre (colluvionnement) aux bas des pentes.

De cet équilibre stabilité/érosion dépend l'évolution des sols sur un même matériau.




Figure 3 : Schéma de l'influence d'une toposéquence type

D'une façon générale, le caractère calcique (perte plus ou moins totale du calcaire total) est fortement lié à une plus grande profondeur de sol, une couleur plus brune, parfois brun rougeâtre, une charge en cailloux plus faible et plus de silt et d'argile dans la terre fine. Les remaniements, parfois très importants, peuvent masquer ces caractéristiques en surface.

3.7 LES PROPRIÉTÉS HYDRIQUES DES SOLS

Réserve en eau

Tous les chiffres cités dans ce chapitre sont des ordres de grandeur à prendre avec précaution.

Outre sa très forte liaison (quasi-proportionnalité) avec la teneur en cailloux et la profondeur utilisée par les racines, le point crucial qu'est la réserve en eau est dépendant de la texture du sol mais aussi de sa structure (faculté de former des agrégats petits et poreux ou au contraire de rester en blocs compacts, peu fissurés et peu poreux).

Certains sols argileux se débitent en gros prismes très compacts dans lesquels les racines ne pénètrent pas. L'humidification et la dessiccation de ces sols se fait alors suivant un rythme très différent de celui de sols finement structurés et colonisés par les racines selon une maille plus dense (et la teneur en argile peut être la même dans les deux cas).

La qualité des argiles influe nettement sur la qualité de la structuration spontanée : des argiles à forte CEC donneront des sols mieux structurés (alternance de gonflement / retrait de plus forte amplitude), mais qui se dessècheront aussi plus profondément.

L'acidité et le manque de matière organique conduisent à dégrader au contraire la structure du sol, le rendant battant s'il est limoneux et compact et asphyxiant s'il est argileux. La présence de cailloux et surtout de graviers améliore la structuration des sols argileux en multipliant les plans de fissuration et de décollement. La présence d'argile dans un sol modifie profondément la gestion de l'eau.

Relation quantité d'eau / texture

Un sol argileux peut stocker 3 à 4 fois plus d'eau totale qu'un sol très sableux (humidité maximum à la "capacité au champ" = 35 % du volume en sol limono-argileux, 8 % en sol sableux).

Mais au-delà d'un certain dessèchement, les plantes ne peuvent plus extraire l'eau du sol.

Un sol argileux "sec" pour la plupart des plantes (autres que la vigne), arrivé à son « point de flétrissement » contient encore de 20 à 25 % d'humidité. Un sol sableux "sec" pour les plantes n'en contient plus que 3 %.

Relation diffusion de l'eau dans le sol / texture

En période de consommation

Dans un sol argileux, l'eau circule lentement mais régulièrement depuis les zones les plus humides du sol vers les zones les plus sèches, asséchées par les racines (l'eau "circule" sous forme de minces films d'eau continus autour et dans des agrégats de terre).

Cette diffusion lente peut se faire au sein des grosses mottes (de l'intérieur de la motte compacte vers l'extérieur de la motte et les fissures empruntées par les racines). Elle se fait aussi des horizons profonds humides vers les horizons moyens (plus d'un mètre dans les sols limono-argileux). C'est probablement ce phénomène lent mais continu qui explique le bon comportement hydrique des sols extrêmement caillouteux de terrasses à galets et horizon argileux profond (terrasses rhodaniennes).

Au contraire, les pores trop gros des sols sableux ne permettent pas une diffusion aussi efficace lors du dessèchement. Quand les films d'eau sont rompus (à la suite d'une forte consommation en journée chaude et ventée par exemple), ils ne peuvent se reformer et l'eau ne circule plus de l'humide vers le sec (c'est le même effet mais favorable cette fois, qui est recherché par le binage qui empêche l'évaporation par la surface en rompant la continuité des pores capillaires qui débouchent vers l'atmosphère).

En période de pluie (recharge des sols)

En période de pluie, les sols perméables, donc sableux ou caillouteux, se rechargent mieux et plus vite en profondeur que les sols plus lourds. La même quantité d'eau sera plus efficacement stockée et mise à l'abri de l'évaporation ou du ruissellement. Encore faut-il que la surface ne soit pas battante (silts ou sables fins non calcaires). Quand on sait que les pertes entre pluviométrie et eau infiltrée peuvent atteindre 70 % dans les cas les plus défavorables, il convient de nuancer les raisonnements : un sol de pente à forte réserve théorique (marne argileuse bien structurée par exemple) peut très bien se recharger moins correctement qu'un sol de plus faible réserve, mais couvert d'un masque caillouteux.

Au contraire, en fin de période hiver / printemps très pluvieuse, certains sols argileux seront saturés et rendus à peu près imperméables par le gonflement des argiles qu'ils contiennent. La circulation de l'eau s'arrête, elle occupe l'espace normalement occupé par l'air et l'asphyxie commence. Ceci peut modifier considérablement le volume du bulbe racinaire utile (cycles climatiques secs = approfondissement du volume exploré / cycles humides = diminution du volume exploré) et créer des effets à retardement (année sèche mal supportée après une année humide par exemple : raisonnement sur des cycles pluriannuels de pluviométrie). Dans ce dernier cas, les racines profondes n'arrivent pas à grossir et restent à l'état de chevelus sains associés à des racines plus ou moins « pourries ».

Relation réserve en eau / comportement qualitatif

Au niveau de l'interprétation "viticole" de ces données, on peut dire qu'un sol argileux (pris au sens large: plus de 20 % d'argile) "presque" sec (au tiers de la réserve utile) contient encore 0.6 mm par centimètre de sol d'eau fortement retenue, mais encore disponible, alors qu'un sol sableux au même état de rétention n'en contient plus que 0.2 mm. En sol profond (1.50 m) cela représente encore 90 mm pour le sol argileux (900 m³ par hectare). Il est probable que les rameaux continuent à pousser, le sol n'arrivant à ce point de dessiccation que tardivement dans la saison.

Un sol aussi argileux et profond, mais très caillouteux contiendra 2 à 3 fois moins d'eau au départ, en consommera moins au début (moins de végétation), atteindra plus vite le stade optimal de contrainte et consommera doucement les 40 mm d'eau fortement retenue lui restant, après la mi-juillet.

Un sol sableux moyennement profond consommera plus vite l'eau peu retenue en mai-juin, ce qui favorisera la croissance printanière, mais manquera de réserves de fond pour tenir avec les mêmes 40 mm que le sol précédent, et ceci pendant une période plus longue (env. 1 mois) avec un appareil végétatif plus important.

Influence de la force de rétention de l'eau par le sol en période de maturation

Extraire de l'eau fortement retenue par le sol nécessite une forte élévation de la concentration des liquides cellulaires et intercellulaires de la plante et l'on conçoit que les composants du raisin élaborés dans ces conditions ne soient pas de mêmes nature et concentration que lorsque l'eau reste facilement accessible longtemps dans la saison.

Pour que se réalise cette conjonction favorable, il faut qu'un sol "argileux" soit "presque" sec et ceci pendant une durée suffisante, ce qui n'arrive qu'exceptionnellement dans le cas des sols profonds peu caillouteux (les rameaux doivent s'arrêter de pousser et la maturation se poursuivre le plus longtemps possible).

L'allongement des racines en profondeur et le vieillissement racinaire ont un effet un peu similaire puisqu'il faudra plus d'énergie pour remonter de l'eau de 2 mètres, avec des racines vieilles en partie obturées et très tortueuses (sols caillouteux par exemple). Certains calcaires, marno-calcaires ou grès calcaires en plaques peuvent également constituer un milieu contraignant mais non stressant.

Les multiples substances responsables de la qualité finale du vin ne sont pas parfaitement connues, mais on peut imaginer qu'elles ne sont pas toutes synthétisées en même temps, ni au même rythme, au cours du cycle de végétation. Il est même probable que certains composés sont élaborés à des périodes précises d'avancement de la maturation et que leur présence et/ou leur abondance dépendent de l'état de "fraîcheur" du feuillage à cette période précise. C'est à chaque moment du cycle qu'il faudrait donc envisager le niveau de contrainte hydrique opposée aux racines et c'est une hypothèse qui peut expliquer l'infinie variété des millésimes pour les fins dégustateurs (notion d'itinéraire hydrique propre à chaque trio plante/sol/millésime).

Les sols ne sont pas simplement argileux ou sableux, profonds ou non, caillouteux ou non. La nature offre une mosaïque de sols passant progressivement des uns aux autres, drapés sur un relief qui va nuancer les expositions, la pénétration et la circulation interne de l'eau vers les bas de pentes, accentuer ou au contraire atténuer les caractères internes de chaque sol. Chaque parcelle donne bien souvent par elle-même un assemblage naturel de produits.

Par ailleurs, les influences dues aux autres composantes du terroir, climat, cépage, conduite du vignoble, dominant parfois sur les nuances strictement liées aux sols, qui ne peuvent être jugées que toutes choses égales par ailleurs.

En particulier, un équilibre doit être recherché entre le sol, la charge et la surface foliaire exposée (SFE), faute de quoi l'effet «sol» risque de passer inaperçu.

L'interprétation de ces multiples données reste donc un art qui laisse une large part à l'intuition et à la connaissance profonde des vigneron et des techniciens attachés à chaque secteur.

3.8 GÉNÉRALITÉS SUR L'HYDROMORPHIE

Les sols hydromorphes présentent des caractères attribuables à un excès d'eau.

Il convient d'en estimer l'origine, la profondeur d'action et la durée pour juger de ses effets néfastes par rapport à une activité humaine donnée.

Les origines des excès d'eau

L'excès d'eau dans les sols peut avoir des origines variées :

- le ruissellement de sub-surface dans les pentes sur plancher imperméable
- les nappes perchées d'eau stagnante en position de plateau-replat sur plancher imperméable
- les résurgences de nappes souterraines qui créent des mouillères ou des sources locales dans les pentes
- les nappes alluviales en relation avec un ruisseau ou une rivière qui se développent en position basse de plaine.

Les marqueurs visibles

Les changements d'état d'oxydation du fer et par voie de conséquence ses redistributions en taches de couleurs différentes sont de très bons indicateurs du type d'excès d'eau.

- Si l'engorgement est temporaire, l'oxydation du fer en Fe^{+++} se marque par la présence de taches rouille. Sous cette forme, le fer est immobilisé.
- Plus la nappe est durable, plus la couleur bleuâtre ou grisâtre du fer réduit en Fe^{++} domine. Le fer devient mobile et peut migrer.

Les 4 types d'hydromorphie et leurs conséquences agronomiques

L'intensité et la durée de l'engorgement sont très variables et elles permettent de distinguer 4 types de sols hydromorphes par l'observation des états du fer. Ces 4 types d'hydromorphie sont représentés à la figure 4 et sont dénommés par un chiffre après la virgule (,1/ ,2/ ,3/ ,4); cette notation fait référence au système de codification des sols, expliqué au chapitre 4.2.




Figure 4 : Schéma des grands types de sols hydromorphes

Hydromorphie de type ,1 : excès d'eau temporaire au contact d'une roche imperméable par ruissellement latéral dans les pentes. Ce type de circulation peut compléter un peu l'alimentation en eau du sol par capillarité après des épisodes pluvieux, sans grandes conséquences sur le comportement des vignes. Des difficultés d'accès à la parcelle peuvent se manifester lors des périodes humides (ressuyage ralenti). Sous le niveau taché, à taches peu contrastées (hydromorphie de faible durée) ou profondes, entre 70 et 120 cm, le sol est en général trop compact pour accueillir convenablement les racines.

Hydromorphie de type ,2 : excès d'eau temporaire en profondeur. Présence d'une nappe printanière plus durable qui induit une ambiance fraîche et même humide des sols par capillarité jusqu'en milieu d'été. Il se crée une atmosphère humide sur les parcelles au printemps, qui s'accompagne souvent d'un ressuyage très lent après les pluies. La programmation des travaux du sol devient plus difficile. Ce type d'excès d'eau peut asphyxier les racines de profondeur les années humides, et être à l'origine de perturbations des vignes selon les enchaînements de millésimes (secs/humides).

Hydromorphie de type ,3 : excès d'eau temporaire à faible profondeur. Les taches rouilles et grises apparaissent avant 50 cm. Présence de nappe temporaire proche de la surface, qui perdure assez longtemps en profondeur. Les sols sont constamment humides ce qui limite leur réchauffement et asphyxie fortement les racines dès 50 cm de profondeur. Le microclimat humide persiste jusqu'aux vendanges et les vignes présentent de fortes variations de vigueur selon les enchaînements de millésimes, présentant paradoxalement des signes de stress hydrique les années sèches succédant à des années humides (le manque de racines de profondeur explique parfaitement ce fait).

Les zones des types ,2 et ,3 sont souvent drainées.

Hydromorphie de type ,4 : excès d'eau permanent à moins de 80 cm de profondeur et temporaire dès la surface. Cette configuration ne permet pas un bon développement des racines. Elle empêche le réchauffement des sols et leur ressuyage et développe une ambiance très humide. Le comportement des vignes est profondément perturbé, les travaux sont très difficiles à programmer.

4. METHODOLOGIE ET PRINCIPES DE CODIFICATION DES SOLS

4.1 MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE

L'étude a pour but de délimiter, sur la carte, des zones géographiques pour lesquelles les caractéristiques de sol importantes pour le fonctionnement viticole sont les plus proches possibles (même roche mère, même degré d'évolution et profondeur d'enracinement de même ordre de grandeur, ces éléments permettant la définition d'un type de sol précis). Ce découpage en unités de sols se fait selon le protocole brièvement rappelé ci-dessous.

Processus d'élaboration des unités de sols

Phase 1 :

Synthèse et analyse des documents disponibles : cartes géologiques, coupes, sondages à la tarière existants, photographies aériennes infrarouge au 1:10'000.

Campagne de prospection à la tarière (1 sondage pour 2.5 ha en moyenne, soit une précision de moyenne échelle, 1:15'000 environ).

Préparation des minutes de terrain, de la légende et des documents supports de la première réunion avec les viticulteurs.

Phase 2 :

Première réunion avec les viticulteurs : présentation et choix des emplacements des profils à creuser.

Ouverture des profils (par les vigneron), description et analyse des profils, prélèvements pour analyse.

Visites de terrain sur les profils les plus représentatifs, avec les viticulteurs et des conseillers.

Numérisation de la carte provisoire, rédaction de la légende, saisie des fiches-profils, fiches-unités, schémas sur la base de donnée.

Phase 3 :

Séance de validation : explications, présentations, puis validation ou correction des unités de sols et des limites par les vigneron.

Phase 4 :

Prise en compte des modifications et remarques dans l'élaboration de la carte, édition définitive des fiches de profils, rédaction du rapport d'accompagnement.

4.2 PRINCIPES DE CODIFICATION DES UNITÉS DE SOLS

Les unités de sols sont définies par des codes qui se lisent comme des codes comptables. Ils se composent de quatre chiffres complétés parfois par un chiffre après la virgule et une sixième position (lettres ou indications spécifiques).

Code exemple : **21 15, 1 X**

Les deux premiers chiffres indiquent la roche mère (en place ou légèrement déplacée) à l'origine du sol : voir plus bas, liste des roches mères.

Le troisième chiffre traduit le degré d'évolution du sol. Plus un sol est évolué, plus en général il s'approfondit et devient complexe :

- 0 : **REGOSOL, RENDOSOL**: sol brut et clair très peu différent de la roche mère, pas d'horizon brun net au-delà de 20-30 cm.
- 1 : **CALCOSOL**: sol calcaire sur toute la profondeur, différent de la roche mère par la couleur, le taux de cailloux, la consistance, sur au moins 50-60 cm.
- 2 : **CALCOSOL calcarique**: le calcaire se redistribue en accumulations, amas, à moyenne profondeur ou bien des fragments de tuf font augmenter notablement le taux de calcaire et perturbent la progression des racines.
- 3 : **CALCISOL**: sol issu de roche mère calcaire (moraine ou autre) mais qui a perdu son calcaire sur une partie au moins de ses horizons.
- 4 : **CALCISOL rubéfié**: présence d'un horizon rouge, argileux, décarbonaté, en général vestige ou relique de sols anciens (avant les premières défriches).
- 5 : **BRUNISOL** légèrement acide: sol aux mêmes caractéristiques que le CALCISOL, mais légèrement acide.
- 6 : **LUVISOL**: sol acide et léger en surface, à horizon argileux de profondeur.
- 9 : **UNITE COMPLEXE DE SOLS DIFFERENTS**

Le quatrième chiffre reflète **la profondeur d'enracinement** possible et probable :

PROFONDEUR EN CENTIMETRES	
1	P < 50
2	P 50 - 70
3	P 70 - 100
4	P 40 - 100 zones de profondeur variable
5	P 100 - 180
6	P > 150 et pente inférieure à 7 - 10 %
9	Composite, indéterminable, 20 - 250
Les limites sont indiquées avec une signification de +/-10%	

Le chiffre après la virgule traduit, le cas échéant, le degré **des excès d'eau** temporaires ou permanents observables (types d'hydromorphie) :

HYDROMORPHIE	
,1	sol à caractère rédoxique léger ou à circulation latérale d'eau
,2	excès d'eau temporaire à une profondeur supérieure à 50 cm (net à 70-80 cm)
,3	excès d'eau temporaire visible à une profondeur inférieure à 50 cm
,4	caractère rédoxique de sub-surface et/ou excès d'eau permanent (gley gris bleu) à une profondeur inférieure à 80 cm

La sixième position caractérise certaines **variantes locales** de l'unité de sols :

VARIANTES LOCALES DE L'UNITE DE SOLS	
< 90	unité complexe recouverte par la formation 90
/ 20	unité complexe superposée à la formation 20
+	recarbonaté en surface
A	zones plus plastiques
Ca	accumulations de calcaire tendre en profondeur
Dx	présence de drain ou de lits de cailloux en profondeur
G	zone de glissements actifs ou anciens
R	remblais ou zones fortement remaniées
S	zones plus sableuses
Tour	niveaux organiques enfouis
T	zones à tuf
X	zones plus caillouteuses
Z	zones aménagées en terrasses

Le code exemple 2115,1X signifie donc :

"Calcosol très profond, sur moraine peu compacte, légèrement rédoxique (ou avec circulation latérale d'eau), situé dans une zone plus caillouteuse que la normale".

ROCHE MERE A L'ORIGINE DU SOL (2 premiers chiffres de l'unité)	
20-29 : SOLS ISSUS DE FORMATIONS GLACIAIRES EPAISSES: MORAINES, DEPOTS FLUVIOGLACIAIRES ou GLACIOLACUSTRES	
21	Moraine rhodanienne caillouteuse, peu ou moyennement compacte en général - à éléments grossiers mélangés calcaires et siliceux (EG* mixtes)
23	Sable ou Moraine sableuse peu caillouteuse EG* < 15-20 %
24	Moraine de fond compacte et peu caillouteuse EG*<15- 20 %
25	Moraine « marno-molassique » plus argileuse, peu caillouteuse, litée (rabotage-pétrissage de molasse argileuse)
26	Moraine locale du Chablais à éléments calcaires majoritaires, 40-50% d'EG*, terre fine légère
27	Fluvio-glaciaire, glacio-torrentiel ou moraine très sablo-caillouteuse de retrait
28	Dépôts glacio-lacustres gris beiges et lités (varves de sables et silts très peu caillouteuses)
30-39 : SOLS ISSUS DE MORAINES EN FAIBLE COUVERTURE	
31	Moraine moyenne sur grès molassique
32	Moraine moyenne sur marne molassique
33	Moraine moyenne sur conglomérat molassique
34	Moraine moyenne sur calcaire (jaune jurassien, noir du lias)
35	Moraine locale sur Gypse
36	Moraine sur Flysch
40-49 : SOLS ISSUS DE ROCHES CALCAIRES	
41	Grès calcaire
42	Poudingue calcaire du Pèlerin
43	Calcaire gréseux jaune du Jura
44	Calcaire fortement gypseux/ Gypse
45	Calcaire marneux noir en plaques (Flysch de Chiètres)
46	Marno-Calcaire noir feuilleté peu calcaire de Chiètres
47	Marno-Calcaire beige à bancs marneux
50-59 : SOLS ISSUS DE MARNES ET AUTRE ROCHES CALCAIRES NON OU PEU CONSOLIDEES	
51	Marne limono-argileuse beige
52	Molasse sablo-gréseuse grise ou bariolée du Vully, rares lentilles marneuses lie de vin
53	Marnes rouges à bancs gréseux
54	Marnes bariolées lie de vin/ beige/ bleuté/ocre
55	Marnes beiges à petits bancs gréseux
58	Molasse complexe de l'Orbe à marnes lie de vin, sables beiges, marno-calcaires, calcaires lacustres et grès poreux, fracturés, en lentilles métriques
60-69 : AUTRES ROCHES NON CONSOLIDEES, FORMATIONS SUPERFICIELLES	
61	Eboulis et cônes à éléments anguleux EG* calcaires 40-60 %
62	Eboulis et cônes à éléments anguleux EG* calcaires >60 %
63	Loess (silt éolien) poreux, non caillouteux
64	Cônes torrentiels à éléments arrondis mixtes, terre fine moyenne
68	Épandage caillouteux de coulée boueuse récente et compactée à terre fine lourde
80-89 : SOLS DE PLAINE ISSUS D'ALLUVIONS RECENTES	
81	Alluvions de texture moyenne
82	Alluvions de texture sableuse
83	Alluvions caillouteuses, texture non sableuse
84	Alluvions caillouteuses, texture sableuse sur tout le profil
90-99 : SOLS DE PLAINE ou de PIED DE COTEAUX, ISSUS DE COLLUVIONS RECENTES	
91	Colluvions de texture moyenne
92	Colluvions de texture sableuse
93	Colluvions caillouteuses
97	Colluvions sur cailloutis: EG* > 60 % en profondeur
98	Dépôts variables récents de pentes et combes en bordures de torrents

*EG = Eléments grossiers, taille de 2 mm (graviers) à 1 m et plus (blocs)

4.3 PRINCIPES DE LECTURE DES FICHES DE DESCRIPTION

Il existe deux types de fiches de description : les fiches de description des profils et les fiches de description des unités de sol.

Fiche de description des profils




Figure 5 : Fiche de description des profils

A. Description des horizons

Les principales caractéristiques des horizons sont décrites en clair, les termes couramment employés sont parfois abrégés, en particulier ceux concernant la texture et les racines.

• La texture

La notion de texture est complexe. Elle peut être définie de deux façons.

C'est un jugement sensoriel global sur la composition porté sur le terrain, grâce à des sensations tactiles (pétrissage entre les doigts) mais aussi optiques, auditives voire gustatives.

La texture peut également être déduite de l'analyse granulométrique exprimée sur un diagramme de texture (voir le diagramme du Groupement d'Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée GEPPA, 1963). Une certaine distorsion entre ces deux façons de définir la texture est normale.




Figure 6 : Diagramme de texture du GEPPA, 1963

• L'appareil racinaire

Dans le texte de description des horizons, les racines sont évoquées de façon rapide selon leur taille et leur densité de colonisation.

Quelques rares abréviations sont parfois employées pour condenser le texte des profils complexes :

- MO : matières organiques
- EG : éléments grossiers
- CT : calcaire total
- CA : calcaire actif

B. Noms des horizons

Chacun des horizons est identifié selon la base du Référentiel Pédologique (1995) : voir glossaire. Les horizons profondément transformés par l'homme sont codifiés par un Z.

C. Le profil racinaire

Des comptages de racines sont systématiquement réalisés sur les profils ouverts, sauf dans quelques cas (profil trop loin de la souche, souche morte, fosse éboulée...) et permettent de dresser un profil racinaire basé sur la taille et le nombre de racines comptées.

Ils sont effectués selon un protocole rapide, en comptant les racines visibles sur une grille maillée de 80 cm de large par catégorie de grosseur : GR diamètre supérieur à 0.5 cm, R de 1 à 5 mm, r moins de 1 mm et ch (+), +, ++ ou +++ selon l'abondance du chevelu très fin et très ramifié.

D. Le profil hydrique

Les profils hydriques que nous présentons sont une image simplifiée de la taille du Réservoir Utilisable Maximum. Ce n'est évidemment que lorsque ce réservoir est rempli qu'il devient une réserve.

Chaque barre est une estimation en mm d'eau par tranche de 10 cm de sol (= Réserve "décimétrique"). Elle tient compte de la texture et de la quantité d'éléments grossiers. La méthode employée est tirée du Guide pour la description des sols (D. Baize 1995).

Nous introduisons un facteur de pondération qui prend en compte la colonisation observée des racines, ce qui améliore la pertinence des estimations en particulier pour les sols lourds ou compacts. Selon la densité de colonisation racinaire, on estime la part de l'eau utilisable par les racines (en bleu) et la part non (ou difficilement) utilisable (en orange).

E. Les réserves utiles

A partir du profil hydrique, on peut estimer les réserves en eau du sol (plus exactement le réservoir). Selon le volume pris en compte, trois chiffres sont indiqués sous les graphiques:

Réserve Utilisable : quantité d'eau directement et assez facilement utilisable par la plante (= bleu) dans les horizons bien colonisés par les racines. La réserve utilisable correspond au volume d'eau à la capacité au champ moins le volume d'eau au point de flétrissement "pF4.2", pondéré par un coefficient d'exploration racinaire de 1, 0.5 (moins de 10 fines racines sur la tranche de sol), ou 0.1 (très rares racines ou chevelus dans des plans de fissure).

Réserve sur la profondeur d'enracinement : réservoir utile maximum du sol sur la profondeur d'enracinement. C'est donc ce chiffre qui correspond au réservoir utilisable maximum (bleu + orange sur profondeur d'enracinement.). Il prend en compte sans pondération les horizons peu ou très irrégulièrement colonisés par les racines jusqu'aux dernières observées. La quantité représentée par les surfaces "orange" correspond à de l'eau qui ne peut migrer que très lentement vers des racines rares et/ou en mauvais état.

Réserve Potentielle Totale : quantité d'eau utile que le sol peut stocker sans tenir compte de la morphologie de l'appareil racinaire existant (= bleu + orange en totalité, y compris les horizons profonds sans racines). En effet, ceux-ci peuvent s'humecter lors de longues périodes de pluie, surtout quand la pente est faible. On ne peut pas quantifier l'importance physiologique de cette humidité sous-jacente, mais il est sûr qu'elle a dans certains cas une influence très forte (niveaux de marne ou de moraine de fond sans aucune racine, sous des sols très graveleux par exemple) au moins pour les premiers décimètres concernés. D'autre part, certains sols peuvent être très mal enracinés pour des raisons indépendantes du sol (implantation, premières années difficiles).

Fiche de description des unités de sol




Figure 7 : Fiche de description des unités de sols

1. Secteurs

Pour la réalisation de l'étude, le canton a été découpé en quatorze secteurs qu'il est commode de repérer par une abréviation de deux lettres dans la base de données (numérotation des sondages, requêtes groupées etc).

1. CH : Bex et Ollon Zone pilote du Chablais	8. AU : Aubonne, Féchy et Perroy
2. YV : Aigle et Yvorre	9. RO : Mont-sur-Rolle, Tartegnin et Coteau de Vincy
3. MV : Vevey-Montreux et Villeneuve	10. LC : Bursinel, Vinzel, Luins et Begnins Zone pilote de La Côte
4. LV : Chardonne et St-Saphorin Zone pilote de Lavaux	11. NY : Nyon
5. DZ : Dézaley, Epesses et Calamin	12. OR : Côtes-de-l'Orbe
6. LU : Villette et Lutry	13. BV : Bonvillars Zone pilote de Bonvillars
7. MO : Morges	14. VU : Vully (Vaudois)

2. Variantes

Les fiches de description des unités de sols concernent les unités les plus étendues. Les unités qui ne s'en distinguent que par un ou deux paramètres secondaires sont décrites en tant que variantes de l'unité principale.

3. Caractéristiques moyennes

Dans un souci de synthèse, les unités de sols sont décrites par leurs paramètres de fonctionnement moyens.

- La nature de la limitation fait référence aux phénomènes susceptibles de limiter l'enracinement en profondeur.
- Les indices de RU (réserve utile) sont une représentation numérique du réservoir utile (en cm d'eau) calculé pour quatre blocs de sol de 50 cm de profondeur. Cette représentation permet de codifier la répartition de l'eau sur un profil de sol et de distinguer ainsi des sols très différents mais de même réserve : un sol **6/8/0/0** a le même réservoir de 140 mm qu'un sol **3/2/5/4** (60 + 80 + 0 + 0 et 30 + 20 + 50 + 40 mm). Le premier est « court et large », il s'arrête à un mètre de profondeur. Le second « long et étroit », les racines descendent à 2 mètres.
- Les cases concernant les racines en notent simplement l'absence ou la présence probable.

4.4 LES LIMITES DE LA REPRÉSENTATION CARTOGRAPHIQUE

La précision finale théorique de la carte est de l'ordre du 1:12'500 (une observation pour 2 ha), mais elle est éditée, pour des raisons de lisibilité et de commodité, au 1:7'071 (1 cm² = 0.5 ha).

Ce n'est donc pas un travail d'une précision parcellaire alors que le morcellement est fort et que la variabilité des paramètres importants du sol (profondeur, texture, pierrosité, compacité) engendre des unités réelles de moins de 1 ha en moyenne. Cependant, les caractéristiques de chacun des sols présents sur la zone doivent être analysées, décrites et bien comprises.

La nomenclature des unités de sol et des profils est basée sur les mêmes principes, mais s'il est toujours possible de rattacher un profil à un code simple, certaines unités de sol sont des complexes de plusieurs sols juxtaposés et impossibles à cartographier à cette échelle :

- Exemple : les unités NNN4 sont par définition de profondeur variable (40 à 100 cm) et donc elles sont composées d'unités NNN2, NNN3, voire NNN5. Il est donc logique de trouver un **profil** 2113 dans une **unité** 2114.
- Cas particulier : l'unité de sol 3399 (poudingue du Pèlerin) est formée d'unités simples 3343 + 3344 + 3313 + 3314 + 3215 + 5215, quelques passées de 2115, juxtaposées sans connexion évidente avec la topographie actuelle (très importants et très anciens remaniements d'origine humaine et/ou variations aléatoires et rapides des couches de roche mère). Sa définition est alors précisée dans la fiche d'unité.

Parfois une logique est facile à trouver en fonction de la topographie :

- Exemple : les unités 2414 sont souvent des combinaisons de 2412 ou 2413 en haut de pente convexe passant progressivement à 2415 dans le tiers inférieur de la pente ou les pentes modérées inférieures à 10-15 %.

B) PARTIE SPECIFIQUE AU SECTEUR

5. TRAVAUX REALISES

5.1 INVESTIGATIONS ENTREPRISES DANS LE SECTEUR

Sur les 312 ha de vignes des quatre appellations concernées, 294 ha ont été cartographiés.

La prospection à la tarière n'a concerné que la zone Vinzel/Bursins/Bursinel, car le très dense travail de sondage effectué dans le cadre des travaux effectués pour les syndicats d'arrosage (SAGE et SANE) a été récupéré pour Begnins, Gland et Luins. Quelques sondages de complément ont cependant été réalisés.

La densité de l'enherbement rend souvent difficile les observations rapides de surface (vérification du taux de cailloux, changements de couleur du sol).

Le creusement des profils s'est fait en fin d'hiver 2001, période extrêmement pluvieuse. De nombreux profils ont subi l'"effet baignoire" classique des sols de pentes sur matériaux compacts.

96 sondages tarières ont été effectués et 22 profils ouverts.

Un certain nombre de profils et d'analyses de terre de vigneron ont été intégrés pour la synthèse, ainsi que les études géotechniques ou agronomiques préexistantes sur la zone.

5.2 LISTE DES PROFILS DU SECTEUR

22 profils ont été creusés sur le secteur.

N° de profil	Commune	Lieu-dit	Code cartographique*
BURSL.01	Bursinel	Le Grand Clos	2433,2
BURSL.02	Bursinel	Chavannes	9135,2 R
DULLY.01	Dully	Bourg d'Amont	2413,1
DULLY.02	Dully	Es Jonchères	2736
BURSI.01	Bursins	Bursins	9146/27
BURSI.02	Bursins	St-Vincent	2736
VINZE.01	Vinzel	Blanche Vigne	2135
VINZE.02	Vinzel	Trois Carreaux	2114/2115
VINZE.03	Vinzel	Derrière la Maison	3115/2115
VINZE.04	Vinzel	Les Chaponnières	2115
LUINS.01	Luins	Capite	2413,1
LUINS.02	Luins	Perraillon	2715
LUINS.03	Luins	Corneaux	2413,1
BEGNI.01	Begnins	Les Cottés	2135,1 SX
BEGNI.02	Begnins	La Clodiaz	2114,1
BEGNI.03	Begnins	Combe Vallière	2413,1 DX
BEGNI.04	Begnins	Fleuri	2735
BEGNI.05	Begnins	Sein-Dené	2135 X(+)
BEGNI.06	Begnins	Courson	9135,3
BEGNI.07	Begnins	Les Grâces	9134,4
GLAND.01	Gland	Les Sâles	2413,1
GLAND.02	Gland	Echelettes	2315

* Le système de codification est expliqué au chapitre 4.2.

6. PRESENTATION TOPOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE SIMPLIFIEE DU SECTEUR

6.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Du haut de ses 707 m, le signal de Bougy domine le vignoble le plus étroit de La Côte. On peut, juste à l'est de Rolle, faire la jonction entre le lac et les premiers bois sans quitter les vignes en deux kilomètres seulement, alors que la distance entre le lac et les plus hautes vignes dépasse cinq kilomètres au niveau de la Serine.

De part et d'autre du rétrécissement de Bougy, le vignoble se scinde en bandes plus ou moins parallèles à la rive du lac, calquées sur le dessin des pentes les plus fortes et séparées de replats ou de larges creux occupés par des cultures annuelles.

Ces lanières de vignobles, exposées globalement vers le sud-est, sont coupées perpendiculairement par des ruisseaux de dynamique très variable, qui déterminent des entailles plus ou moins profondes. Le découpage naturel ainsi créé est souvent repris par les contours communaux. De part et d'autre des principaux ruisseaux (Serine, Promenthouse, Aubonne), se dessinent des coteaux d'expositions bien différentes de la dominante sud-est, voire de petits cirques au-dessus des méandres les plus accentués. A ces rivières correspondent souvent d'anciens cônes ou des deltas graveleux sur lesquels s'avancent les vignes, qui occupent alors des situations parfois presque planes.

A l'est de cette portion de La Côte, on trouve ainsi deux coteaux très distincts : Bursins dont les vignes s'étagent entre 450 et 540 m et Bursinel-Dully entre 390 et 430 m.

A partir de Luins, ce sont cinq à six zones viticoles qui s'étagent progressivement de Begnins vers Gland. De moins en moins pentues au fur et à mesure qu'on se rapproche du lac, elles sont séparées de combes ou de replats non viticoles, à contours peu précis. On voit que, dans cette zone, la localisation des vignes est dictée par l'extension des zones graveleux-caillouteuses en relation avec le cône graveleux de la Serine, et non plus par de strictes considérations de pente.

On trouve sur le secteur des sols, parfois seulement des horizons profonds de sols, de couleur nettement rougeâtre ou tout au moins brun nettement plus vif. Cette couleur, la perte de calcaire et l'altération des cailloux sont des vestiges témoins d'une période plus chaude et sèche que l'actuelle et qui est attestée vers -6000 à -8000 ans. Ce début de rubéfaction n'a pu se produire que sur des sols extrêmement filtrants. On en retrouve la trace surtout à l'ouest de Bursins.

L'altitude maximale de 597 m est atteinte à Begnins, commune qui présente par ailleurs des expositions assez variées autour du promontoire graveleux de Fleuri. Les pentes les plus fortes, d'exposition sud-sud-est, sont observées entre Begnins et Luins (classe 25-35%, approchant les 50% en haut des coteaux), ainsi que dans les pentes tournées vers l'ouest dominant la Serine.

Les gammes d'altitudes, de pentes et d'expositions semblent ainsi assez larges, mais leur effet est très souvent combiné avec celui des sols, qui sont aussi très différents selon les situations topographiques.

6.2 LES PRINCIPALES ROCHES MÈRES DU SECTEUR

La mise en place des roches mères est illustrée par les figures 1 (canton), 8 et 9 (local). Les sols des coteaux qui courent de Begnins à Bursins sont très majoritairement issus de moraines rhodaniennes.




Figure 8 : Coupe géologique simplifiée - zone pilote de La Côte

Les moraines

Les moraines sont des matériaux transportés et déposés par des glaciers. Il y a 35'000 ans, les glaciers étaient au maximum de leur extension, puis ils ont considérablement reculé voilà 12'000 ans. Dans le canton de Vaud, le glacier du Rhône, épais d'environ un kilomètre, drainait de nombreux glaciers locaux, de taille plus modeste, qui descendaient des massifs préalpins le long des principales vallées torrentielles.




Figure 9 : Coupe schématique d'un glacier

Les moraines peuvent être sommairement classées en trois type de roches mères :

1. Moraines latérales caillouteuses rhodaniennes à cailloutis mixte, (30 à 60% d'éléments grossiers siliceux et calcaires) et terre fine moyenne/légère. Les moraines du Chablais sont beaucoup plus riches en graviers et cailloux calcaires. Déposées sur les flancs latéraux des glaciers, elles peuvent être parfaitement meubles, mais aussi compactes et serrées.
2. Moraines de fond peu caillouteuses (0 à 30% d'éléments grossiers), limoneuses (particules très fines mais peu gonflantes), gris beige. Déposées sous les glaces, soumises à de fortes pressions (800 T/m²), elles sont non poreuses, massives, parfois fissurées selon des faces de compression (plans de discontinuités en lames obliques) et très compactes. Les racines ne pénètrent pas ce matériau. Par endroits, la moraine de fond peu épaisse présente des propriétés similaires à la molasse marneuse sous-jacente. Elle est plus argileuse et se débite en prismes en profondeur. On la qualifie de moraine de fond marneuse molassique.
3. Moraines de retrait et/ou formations fluvio-glaciaires, beaucoup plus gravelo-caillouteuses et/ou sableuses (moraines sableuses), toujours meubles. Ces cônes, replats, buttes ou échines, formés en aval du glacier lors de sa fonte, sont assez fréquents sur le canton, mais leurs extensions sont variables selon les zones.

Type de matériau	code*	Eléments Grossiers	Compacité	Calcaire Act/tot	Calcaire total %	Calcaire actif %	Argile %
Moraine latérale caillouteuse	21	25-60%	Variable	0.15 à 0.2	20 à 25	4 à 7	10 à 18
Moraine de fond	24	10-30%	Très forte	0.25 à 0.5	20 à 25	7 à 12	12 à 25
Moraine de retrait sableuse	23	0-20%	Variable	0.1	10 à 20	2 à 7	5 à 10
Moraine de retrait caillouteuse	27	60-90%	Meuble	0.1	10 à 25	2 à 7	5 à 10
Moraine «locale» (Chablais uniquement)	26	40-70%	Modérée	0.15	20 à 50	5 à 10	13

*Code de la roche mère : le système de codification est expliqué au chapitre 4.2.

Figure 10 : Principales propriétés des matériaux glaciaires

Les dépôts glacio-lacustres

Au cours des épisodes glaciaires, de nombreux lacs de barrages glaciaires se sont formés çà et là lors des retraits. Leurs dépôts sont en général calcaires silto-sableux ou sableux, lités (varvés), de couleur gris bleu ou crème. La formation plus franchement sableuse et litée (à litages graveleux) rencontrée au sud de Gland (Gland.02), où elle alterne avec la moraine de fond qui ressort sur les échines (Gland.01), se rattache à ces niveaux, mais son expression et son extension sont mieux cernées sur l'appellation Nyon.

La molasse gréso-sableuse ou marneuse

Ces moraines recouvrent ici la molasse gréso-sableuse oligocène (chattienne), formée de bancs de grès peu consolidés à base de sables gris bleuté un peu argileux, d'âge oligocène (déposée il y a 35 millions d'années). Cette molasse « ressort » par endroit dans les bois de bordure ou le long des ravines très entaillées (unité 9814), mais elle est vite masquée par la moraine et n'intervient que très peu directement dans les sols viticoles. Au contact molasse/moraine sous forêt (talus des bordures des vignes les plus hautes) existe un dépôt de graviers arrondis d'âge interglaciaire qui est assez fortement cimenté par le calcaire et prend l'aspect d'un poudingue. Nous n'avons pas retrouvé cette roche mère dans la zone cultivée, mais sa désagrégation alimente en graviers et cailloux la surface des parcelles situées en dessous.

Les colluvions

Ce sont les épaisissements normaux de bas de pentes, issus de l'érosion progressive des pentes dominantes. Les pieds de coteaux sont naturellement colluvionnés et en général peu ou pas caillouteux (0-20%).

7. LES UNITES DE SOLS DU SECTEUR

7.1 SOLS ISSUS DE MORAINES LATÉRALES CAILLOUTEUSES PEU COMPACTES

Rappels sur la roche mère

Les moraines sont caillouteuses (30 à 70 % de graviers et de cailloux émoussés ou arrondis, calcaires et siliceux, ces derniers étant plutôt dominants), meubles ou parfois compactes en profondeur. C'est le matériau qui domine de Begnins à Bursins (code géologique 21).

Lorsque la compacité s'affirme et que la charge en cailloux diminue au-dessous de 30%, on passe au code géologique 24 (moraine de fond) et aux codes d'unités 2413 à 2436, la limite n'étant pas très nette à la marge.



Figure 11 : Affleurement de moraine caillouteuse

Principes de répartition des sols

Sur les pentes fortes et sur les hauts de pentes érodés, on trouve des sols calcaires de profondeur variable suivant la compacité de la moraine en place (CALCOSOLS caillouteux, unités 2113, 2114, 2115).

Sur les replats intermédiaires et sur les pentes modérées (inférieures à 10%), on trouve des sols non effervescents à l'acide (CALCISOLS, unités 2135, 2136), souvent plus profonds et moins caillouteux que les précédents (on trouve cependant autour des Serraux des sols calciques en situation de pente plus soutenue - unité 2135).

Dans les hauts coteaux de Vinzel, la moraine recouvre la molasse plus ancienne (grès ou sable gris peu consolidé). Cependant, la molasse n'a pas été trouvée sur chacun des trois profils, creusés pourtant très haut dans la pente (VINZE 03, molasse sablo-gréseuse à 1.30 m, unité 3115 ; VINZE 04, molasse non trouvée sur 1.80 m). Autour de ces remontées de molasse, la couleur et la texture de la terre fine associée aux cailloux de moraine change légèrement (plus sableux et gris-bleuté/ocre-rouille atténué - la couleur est celle de la molasse, elle n'est pas liée obligatoirement à des excès d'eau actuels).

Cette nuance non accessible à la tarière n'a pas pu être délimitée ailleurs qu'autour de VINZE 03. Les sols ne sont donc pas obligatoirement plus minces en haut de coteau, car la moraine y est moins compacte que dans les replats intermédiaires ; ils pourraient même être plus profonds.

Le secteur de la Curtillode des hauts de Vinzel présente un affleurement de tuf important et bien connu, repéré par le code d'unité 2124 T (le calcaire total passe à 50% dans ce secteur). Plusieurs profils ont été creusés. Ils ont révélé :

- l'extrême hétérogénéité de la parcelle (5 ou 6 types de sol)
- la structure en « meringue » du tuf poreux en place, de couleur crème
- que le tuf est associé indistinctement à des passées de moraine de fond compacte (ou marne grise), localement assez caillouteuse (à cailloux roulés de moraine rhodanienne). Il est donc en relation avec des écoulements venus des hauts du coteau et non avec une roche mère particulière.

Enfin, le profil VINZE 01 est calcique, peu caillouteux, très poreux et bien drainé. Sa porosité et sa texture moyenne-légère de limon sablo-argileux font songer à un petit remaniement éolien de proximité, associé aux classiques "limons de ruissellement".

Le coteau qui court de Vinzel à Bursins est en fait assez changeant malgré sa topographie régulière et douce.

Terroirs viticoles vaudois

Description des unités de sol

Code cartographique: 2113

Secteurs : DZ LV LC

Situation topographique : pentes, hauts de pentes

Géologie : moraine rhodanienne caillouteuse compacte

Légende carte : CALCOSOL de texture moyenne LSA, 20-40% de charge grossière arrondie non triée, calcaire (20-40% de calcaire total) moyennement profond sur moraine caillouteuse compacte.

Caractéristiques moyennes

Prof. d'activité racinaire : 70 à 100 cm

	Pierrosité	Couleur	Texture	Consistance	Calcaire	CEC
<i>en surf.</i>	20-40%	brun	moy-légère	meuble	10 à 30%	modérée
<i>en prof.</i>	20-70%	beige olive	moy-légère	compacte	10 à 30%	faible

Enracinement limité par : moraine caillouteuse mais compacte

	0-50 cm	50-100 cm	100-150 cm	150-200 cm
Indice de RU [cm/50cm]	4	4	1	0
Racines	rR	Rrch	(ch)	

Réserve estimée

RU max:	115 mm
RU mod:	90 mm
RU min:	60 mm

Variantes : 2113 S/2114 S Texture sensiblement plus sableuse dès la surface. Réserve Hydrique -10%

2113,1 Calcosol de texture variable LSA/ALS 20-40% de charge grossière non triée, calcaire (20-40% de CT) moyennement profond en position de pente soutenue, sur moraine caillouteuse compacte à marques d'hydromorphie temporaire de profondeur et apports d'eau latéraux

2114,1 Idem + profondeur irrégulière. 2114,2 hydromorphie plus marquée

2114 Variante de profondeur plus irrégulière 40-120 cm (après nivellement ou par l'effet naturel du relief) RU irrégulière 80 à 180mm environ


DX Gros drains anciens de pierres repérés ou signalés. Z zone fortement remaniée

Commentaires : L'ajustement très serré des grains dans la moraine compacte même caillouteuse empêche le développement convenable de l'enracinement de profondeur (aucune plasticité).


Exemple de profil représentatif de l'unité




Schéma



Profil racinaire [nb racines/dm]



Profil hydrique [mm/dm]



Réserve utilisable: 74 mm
 Réserve potentielle totale: 80 mm
 Réserve sur la prof. des racines: 75 mm

Prof [cm]

Horizons

0 - 50	Horizon sablo-silteux, calcaire, à structure polyédrique moyenne, 30-40 % de graviers et de cailloux arrondis mixtes, bonne teneur en MO, meuble, bonne porosité, les racines sont nombreuses et horizontales	LAc
50 - 80	Horizon de texture moyenne, calcaire, 30-40 % de graviers et de cailloux arrondis, les racines sont nombreuses, bonne structure, bonne porosité, meuble	Sc
80 - 100	Drain de pierre, très nombreuses racines fines, nombreux vides entre les cailloux, meuble et humide	Z
100 - 140	Sableux et caillouteux (70%) mais très compact. Rares chevulus jusqu'à 110 cm	Dx

Terroirs viticoles vaudois

Description des unités de sol

Code cartographique: 2115

Secteurs : AU BV YV DZ LC LV MV RO

Situation topographique : pentes fortes à très fortes

Géologie : moraine rhodanienne caillouteuse (souvent latérale) non compactée

Légende carte : CALCOSOL de texture moyenne/légère LSA, 20-40% de charge grossière mixte non triée, calcaire (10-20% de calcaire total) profond à très profond (P 1,2 à 2,3m et +), souvent plus sablo-caillouteux en profondeur (50-70%) en pente soutenue issu de moraine rhodanienne non compactée.

Caractéristiques moyennes

Prof. d'activité racinaire : 120 à 180 cm

Enracinement limité par : néant

Réserve estimée

Pierrosité	Couleur	Texture	Consistance	Calcaire	CEC
20 à 40 %	brun	moy.-légère	meuble	modéré < 20%	modérée
30 à 70 %	brun clair	légère	meuble	modéré < 20%	faible

Indice de RU [cm/50cm]	0-50 cm	50-100 cm	100-150 cm	150-200 cm
Racines	5	4	3	3
	R r ch	R r ch	r ch	(R) r ch

RU max:	220 mm
RU mod:	150 mm
RU min:	110 mm

Variantes : 2115 S Variante sableuse dès la surface (A < 10-12%). Réserve un peu plus faible que 2115 : réserve hydrique 43/32 au total 100 à 150mm

2115 X/2115 Xca Variantes plus caillouteuses dès la surface 40-60% RU un peu plus faible, Xca à cailloutis et accumulation de calcaire de moyenne profondeur

2115,1 Sol de texture variable LSA./ALS 20-40% de charge grossière non triée, calcaire (20-40% de CT)moyennement profond en position de pente soutenue, sur moraine caillouteuse compacte à marques d'hydromorphie temporaire de profondeur par apports latéraux. 2115,2 Hydromorphie plus marquée dès 40-50cm

2114 Profondeur plus irrégulière (zones mamelonnées) avec tendance à un début de compacté en profondeur (voir fiche 2113)

2116 Position de bas de pente et/ou profondeur attestée supérieure à 180cm et RU sup à 200mm

DX Gros drains anciens de pierres repérés dans le profil ou signalés. R Zones fortement remaniées. Z terrasses de culture


Commentaires : Se différencie des peyrosols (2715) par une moindre charge en cailloux en surface, mais les horizons profonds du 2115 peuvent être très caillouteux.

Exemple de profil représentatif de l'unité




Prof [cm]	Horizons
0 - 60	Brun, calcaire, moyennement caillouteux (30%), de texture moyenne, bien pourvu en matière organique L_Aca
60 - 110	Brun, calcaire, de moraine (très) caillouteuse (60% d'éléments grossiers de toutes tailles), peu compacte, à gros blocs (60cm), racines abondantes et grosses S_ca
110 - 180	Olivâtre, très changeant, caillouteux avec poches sans cailloux, texture sableuse ou limoneuse, peu compact en moyenne, densité d'enracinement variable, (fines et grosses), moraine peu altérée C
180 - 240	Olivâtre clair, sables plus grossiers, très caillouteux, encore de grosses racines localement, moraine brute peu compacte à cailloutis mixte M_ca

Schéma




Profil racinaire

[nb racines/dm]



Profil hydrique

[mm/dm]



Réserve utilisable: 161 mm
Réserve potentielle totale: 161 mm
Réserve sur la prof. des racines: 161 mm

Terroirs viticoles vaudois

Description des unités de sol

Code cartographique: 2125

Secteurs : BV LC YV

Situation topographique : pas de situations particulières
moraine alpine caillouteuse

Légende carte : CALCOSOL de texture moyenne/légère LSA, 20-40% de charge grossière non triée, très calcaire (+40% de calcaire total) profond (P sup 1,2m), en position de pente soutenue (25-50%) issu de moraine à fragments de tuf ou à accumulations calcaires de profondeur.

Caractéristiques moyennes

Prof. d'activité racinaire : sup. à 150 cm

	Pierrosité	Couleur	Texture	Consistance	Calcaire	CEC
en surf.	20-70%	taché de blanc	moy-légère	peu compact	>40%	faible
en prof.	10-30%	brun	moy-légère	meuble	>40%	modérée

Variantes : 2124 De profondeur variable 70 à 150cm

2124 X Pierrosité plus importante dès la surface 30-50%

T Les zones très localisées sont notées : T sur la carte

2122 Cas particulier rare - Accumulation calcaire très importante et encroûtante empêchant l'enracinement au delà de 50-60cm; RU beaucoup plus faible 40/00 soit 30 à 50mm en tout

Commentaires : Les accumulations de calcaire sont liées aux circulations d'eau actuelles et passées et associées à des situations très variables (pentes 10 à 50%) et non prévisibles.

Exemple de profil représentatif de l'unité




Prof [cm]	Horizons
0 - 50	Brun, de texture moyenne légère Lsa, charge grossière modérée (25% d'éléments grossiers), très poreux, meuble
50 - 140	Brun, très calcaire, très meuble, 25% de cailloux et débris de tuf, calcaire
140 - 180	Brun calcaire, progressivement plus caillouteux et compact, bien enraciné
180 - 200	Plus clair, très calcaire, compact, structure continue à gros blocs de conglomérat et galets de moraine, encore quelques racines


Schéma



Profil racinaire [nb racines/dm]



Profil hydrique [mm/dm]



Réserve utilisable: 162 mm
Réserve potentielle totale: 162 mm
Réserve sur la prof. des racines: 162 mm

Chard.09

Description des unités de sol

Code cartographique: 2136

Secteurs : YV CH DZ LV LC BV AU

Situation topographique : des replats et pentes faibles < 7%

Géologie : moraine rhodanienne ou colluvions de moraine

Légende carte : CALCISOL profond de texture moyenne/lourde LAS/ALS (calcaire total inférieur à 10% au moins dans l'horizon moyen), peu caillouteux 5-20%, brun à brun sombre sur plus de 80cm, des replats de coteaux.

Caractéristiques moyennes

Prof. d'activité racinaire : sup. à 150 cm

Enracinement limité par : néant

	Pierrosité	Couleur	Texture	Consistance	Calcaire	CEC
en surf.	5-20%	brun	moyenne	meuble	<10%	8-12
en prof.	5-20%	brun	moy-lourde	peu compact	0-10%	10-14

Variantes : 2136 + Recarbonaté en surface par apports de terre ou colluvionnement en bas de coteaux calcaires (calcaire en surface mais pas en profondeur)

2136,2 Marques d'hydromorphie vers 60-80cm (bariolage rouille gris net) ou horizon noirâtre de profondeur (anthropique ou tourbeux). 2136,1 Légers excès d'eau. 2136,3 Marques d'hydromorphie à moins de 60 cm

2136 X Charge caillouteuse supérieure à 30% sur toute la profondeur

2135,1 et 2135,2 pour les zones à excès d'eau temporaire au contact de la moraine

2145 Horizon intermédiaire nettement rougeâtre et plus argileux - 2135 p situation de pente supérieure à 15% (rare)

R Zones fortement remaniées. Z terrasses de culture

Commentaires : Réserve hydrique totale régulièrement supérieure à 200 mm. Tous les "calcisols" peuvent être recarbonatés en surface (apports ou colluvionnement).

Réserve estimée	
RU max:	300 mm
RU mod:	220 mm
RU min:	180 mm

Indice de RU [cm/50cm]	0-50 cm	50-100 cm	100-150 cm	150-200 cm
Racines	6 R r	6 R r	5 R r	5 r

Exemple de profil représentatif de l'unité




Prof [cm]	Horizons
0 - 60	Brun, 30 à 40% de graviers et cailloux émoussés mixtes, texture moyenne légère, très peu calcaire, de structure polyédrique grossière, beaucoup de racines (grosses, horizontales), meuble LAc1
60 - 100	Brun (rougeâtre), peu caillouteux, 5-10% de graviers et cailloux, très peu calcaire, meuble, assez poreux, fines racines et chevelus Sci
100 - 130	Un peu plus rougeâtre, plus argileux, très peu calcaire, texture moyenne LAS, 20-30% de graviers et cailloux mixtes, altérés, peu compact, faces luisantes à fins revêtements argileux Sci

Schéma




CHARD03

Profil racinaire



Profil hydrique



Réserve utilisable: 177 mm
 Réserve potentielle totale: 177 mm
 Réserve sur la prof. des racines: 177 mm

Terroirs viticoles vaudois

Description des unités de sol

Code cartographique: 3113

Secteurs : LV LC DZ

Situation topographique : pentes, replats bombés

Géologie : moraine alpine sur molasse gréseuse

Légende carte : CALCOSOL de texture moyenne LSA à LAS, 20-40% de charge grossière non triée, calcaire (10-20% de calcaire total), moyennement profond (P inf. à 90cm), sur molasse gréseuse en plaques, en position de pente souvent convexe (pentes 25-50%).

Caractéristiques moyennes

Prof. d'activité racinaire : 70-100 cm

	Pierrosité	Couleur	Texture	Consistance	Calcaire	CEC
<i>en surf.</i>	20-40%	brun	moyenne	meuble	10-20%	moyenne
<i>en prof.</i>	Roche					

Enracinement limité par : plancher gréseux sub-horizontaux

	0-50 cm	50-100 cm	100-150 cm	150-200 cm
Indice de RU [cm/50cm]	4	4	1	0
Racines	R r	R r ch	ch	

Réserve estimée

RU max:	150 mm
RU mod:	90 mm
RU min:	70 mm

Variantes : 3114 Zone de profondeur variable 50-100cm

3115 Zone de profondeur plus grande 100-150cm, détectable uniquement par profil

3134 Partiellement décarbonaté

3145 Présence d'un horizon brun-rouge plus argileux et non-calcaire


4113 et 4113.1 Recouvrement de moraine sur le grès

Exemple de profil représentatif de l'unité




Prof [cm]	Horizons
0 - 40	Brun rougeâtre, texture moyenne légère (18% d'argile), peu calcaire, 35% d'éléments grossiers LAc
40 - 60	Brun rougeâtre plus clair, texture moyenne légère, calcaire, 40% d'éléments grossiers, rares revêtements argileux Sca
60 - 90	Brun, limono-sableux, plus caillouteux et débris de plaques de grès, compact, faiblement enraciné, racines écrasées entre les plans compacts parallèles à la pente C
90 - 100	Plaques de grès fin, gris vertâtre Rca


Schéma



Profil racinaire [nb racines/dm]



Profil hydrique [mm/dm]



Réserve utilisable: 74 mm
 Réserve potentielle totale: 76 mm
 Réserve sur la prof. des racines: 76 mm

7.2 SOLS ISSUS DE MORAINES DE FOND

Rappel sur la roche mère

Il s'agit de moraine « de fond » peu caillouteuse (0 à 30% d'éléments grossiers), silteuse (particules très fines mais peu gonflantes), gris beige, massive, ou à faces de compression bleutées, et par hypothèse très compacte (trouvée localement sur Begnins, Gland et surtout Bursinel). Les racines ne pénètrent pas ou très difficilement ce matériau (ou alors uniquement sous forme de chevelus à demi ou totalement asphyxiés).

Principes de répartition des sols

Sur les pentes fortes et sur les hauts de pentes érodés, on trouve des sols calcaires de profondeur moyenne à faible suivant la compacité (CALCOSOLS minces ou de profondeur irrégulière, unités 2413, 2414, plus rarement 2415 car la pente est souvent soutenue). A une échelle plus fine, le code 2412 serait même envisageable dans certains cas (50 à 70 cm de sol seulement).

Les eaux de ruissellement ne pénètrent pas la moraine et circulent latéralement dans le premier mètre de sol. Un horizon taché se rencontre alors souvent au sommet de l'horizon morainique brut et compact, même en situation de pente - unités 2413,1 et 2414,1). Des sorties d'eau localisées apparaissent également en certains points des coteaux.

Sur les replats intermédiaires et pentes modérées (inférieures à 10%) on trouve des sols plus profonds, non effervescents à l'acide (CALCISOLS profonds, unités 2435, 2436) et à fréquent caractère rédoxique de profondeur (2435,1 2435,2, voire 2435,3).

Sur certains replats, le drainage est très ralenti et les sols sont alors très nettement rédoxiques dès 40 à 50 cm, voire réductiques (avec horizon uniformément gris bleu), unités 2434,3. La profondeur d'enracinement est alors très irrégulière.

Terroirs viticoles vaudois

Description des unités de sol

Code cartographique: 2413,1

Secteurs : MO LC NY OR RO BV AU DZ

Situation topographique : pentes fortes, bosses

Géologie : moraine de fond, peu caillouteuse et compacte

Légende carte : CALCOSOL de texture moyenne/légère LSA sur moyenne lourde LL.a, 0-20% de charge grossière non triée, calcaire (20-40% de calcaire total) peu profond, sur moraine de fond peu caillouteuse extrêmement compacte, caractère rédoxique temporaire en limite d'horizon travaillé.

Caractéristiques moyennes

Prof. d'activité racinaire : 70-90 cm

Pierrosité	Couleur	Texture	Consistance	Calcaire	CEC
en surf. 5-25%	brun	moy-légère	meuble	10-30%	8-12
en prof. 0-20%	olive clair	moyenne	très compact	20-50%	moyenne

Variantes : 2413 Sans excès d'eau. 2413,2 Caractère rédoxique marqué dès 40cm. 2413,3 Excès d'eau temporaire proche de la surface. 2413,4 Excès d'eau permanent, asphyxie des racines dès 60 cm

2414 Profondeur irrégulière suivant les remaniements, 2414,1/2414,2/2414,3/2414,4 Excès d'eau d'intensité croissante

2415 Profondeur > 100-120cm (mais jamais 2mètres)

2415,1 Variante à excès d'eau temporaire au contact de la moraine. 2415,2 Variante à excès d'eau temporaire en profondeur

2416 Variante sans limitation de profondeur. 2416,2 Variante sans limitation de profondeur mais excès d'eau en profondeur

DX Gros drains anciens de pierres répétés dans le profil ou signalés

Commentaires : Aspect continu de la moraine brute, à grains très fins mais non argileux, avec quelques galets lisses et noirs perdus.

Enracinement limité par : compacité extrême de la moraine

0-50 cm	50-100 cm	100-150 cm	150-200 cm
7	4	0	0
Racines R r ch ch ((ch))			

Réserve estimée


RU max:	130 mm
RU mod:	110 mm
RU min:	60 mm




Schéma



Profil racinaire



Profil hydrique



Réserve utilisable: 138 mm
 Réserve potentielle totale: 212 mm
 Réserve sur la prof. des racines: 173 mm

Exemple de profil représentatif de l'unité

Prof [cm]	Horizons
0 - 60	Brun olive, non calcaire, texture moyenne, structure continue se fragmentant en polyédrique peu nette, porosité biologique, beaucoup de racines horizontales, 15% d'éléments grossiers LAcI
60 - 90	Limons argileux compacts à plages grises bariolées rouilles, calcaire, porosité non visible, racines en mauvais état sanitaire, fines racines et chevelus abondants, rédoxique Sca
90 - 130	Moraine de fond compacte en place, très rares fines racines pourries au sommet, bariolé rouille gris peu contrasté Mca

Terroirs viticoles vaudois

Description des unités de sol

Code cartographique: 2415

Secteurs : MO LC NY OR RO BV AU DZ

Situation topographique : pentes moyennes 8-20%

Géologie : moraine de fond rhodanienne

Légende carte : CALCOSOL de texture moyenne/légère LSA-LAS sur moyenne-silteuse LLa, 0-20% de graviers et de cailloux calcaires et siliceux, calcaire (20-40% de calcaire total), moyennement profond en pentes fortes (90<P<120) et profond en pentes faibles et pentes concaves (120<P<160), sur moraine de fond peu caillouteuse très compacte.

Caractéristiques moyennes

Prof. d'activité racinaire : 100-130 cm

Enracinement limité par : moraine compacte

Réserve estimée

Pierrosité	Couleur	Texture	Consistance	Calcaire	CEC
10-30%	brun	moy-légère	meuble	10-40%	8-12
5-20%	brun clair	moy-légère	compact	20-40%	7-11

0-50 cm	50-100 cm	100-150 cm	150-200 cm
6	7	6	1
R r ch	R r ch	r ch	(ch)

RU max:	240 mm
RU mod:	200 mm
RU min:	150 mm

Variantes : 2414 Profondeur irrégulière 60-150 cm en courts coteaux bosselés

2415,1/2414,1 Un excès d'eau temporaire peut se développer au contact de la moraine. 2415,3 Excès d'eau temporaire à faible profondeur et 2415,4 excès d'eau permanent, les racines sont bloquées à 60 cm

2415 Ca Avec vermiculures et/ou amas calcaires blancs à moyenne profondeur. 2425 Accumulations calcaires plus marquées, rarement indurées


2415/gr Sur grès très localement

2416 Pas de limitations de profondeur. 2416,1/2416,2 Excès d'eau temporaires en profondeur au contact de la moraine

Exemple de profil représentatif de l'unité




Prof [cm]	Horizons
0 - 80	Horizon brun olive, de texture moyenne, calcaire, à structure polyédrique nette, 15 % de graviers et de cailloux arrondis mixtes, bonne porosité, très compact, sec, bonne activité biologique, les racines sont nombreuses, horizontales et verticales, dans la masse, entre les agrégats et dans les pores
80 - 130	Horizon très compact, de texture moyenne silteuse, calcaire, olive, à structure polyédrique moyenne peu nette, 20 % de taches d'oxydation, peu poreux, pas d'activité biologique, rares accumulations calcaires, les racines sont nombreuses, verticales, entre les agrégats, saines et nécrosées pour les plus fines
130 - 190	Moraine de fond très compacte, non structurée, de texture moyenne silteuse, olive, calcaire, 10% de graviers et de cailloux arrondis mixtes, 20 % de taches d'oxydation fines et 10 % de taches de réduction autour des racines, non poreux, pas d'activité biologique, les chevelus sont abondants, morts, aplatis dans des plans de décollement




Schéma

Profil racinaire [nb racines/dm]



Profil hydrique [mm/dm]



Réserve utilisable: 200 mm

Réserve potentielle totale: 277 mm

Réserve sur la prof. des racines: 277 mm

Terroirs viticoles vaudois

Description des unités de sol

Code cartographique: 2435

Secteurs : MO LC NY OR RO BV AU DZ**Situation topographique :** pentes faibles, replats**Géologie :** moraine de fond rhodanienne peu caillouteuse**Légende carte :** CALCISOL brun sombre de pente modérée, de texture moyenne à lourde, peu caillouteux en profondeur, profond (120<P<160 cm) issu de moraine de fond très compacte, parfois plus léger et un peu caillouteux en surface. Moraine brute calcaire au moins au-delà de 90-100 cm.

Caractéristiques moyennes

Prof. d'activité racinaire : sup. à 150 cm**Enracinement limité par :** moraine compacte au-delà de 110-130 cm

	Pierrosité	Couleur	Texture	Consistance	Calcaire	CEC
<i>en surf.</i>	5-25%	brun sombre	moyenne	meuble	0%	moyenne
<i>en prof.</i>	5-30%	brun	moy-lourde	meuble	0%	moyenne

	0-50 cm	50-100 cm	100-150 cm	150-200 cm
Indice de RU [cm/50cm]	8	8	5	1
Racines	R r ch	R r ch	R r ch	ch

Réserve estimée

RU max:	300 mm
RU mod:	220 mm
RU min:	180 mm

Variantes : 2435,1/2435,2/2435,3 A caractère rédoxique de profondeur croissant

2434 De profondeur variable

2436 Très profond en bas de pente longue et modérée ou concave, mêmes variantes rédoxiques, 1,2,3,4


2436 + Recarbonaté en surface. 2436 Tou À niveau noir organique enfoui

2433,3 et 2433,4 Excès d'eau de forte intensité, les racines ne se développent pas en profondeur



Exemple de profil représentatif de l'unité



Schéma



Prof [cm]	Horizons
0 - 40	Brun, peu à non calcaire, texture moyenne, non caillouteux, très poreux (forte activité biologique), très bien enraciné L.Aci
40 - 95	Brun, très peu caillouteux, non calcaire, lit de grosses plaques de granite, très poreux (activité biologique), beaucoup de fines racines et chevelus Ac
95 - 120	Olive clair, très calcaire, très peu caillouteux, compact à très compact, quelques fines racines avec manchon de calcite, très peu poreux, pas de structure (continue) C
120 - 150	Idem précédent, sans racines, très compact C

Profil racinaire
[nb racines/dm]Profil hydrique
[mm/dm]

Réserve utilisable: 178 mm
 Réserve potentielle totale: 215 mm
 Réserve sur la prof. des racines: 193 mm

7.3 SOLS ISSUS DE DÉPÔTS SABLO-CAILLOUTEUX MEUBLES

Rappels sur les roches mères

1. Moraine de retrait et/ou formations fluvio-torrentielles, très gravelo-caillouteuses et sableuses, toujours meubles. Ces cônes et replats hauts ou bas ont été rencontrés en plusieurs sites d'extension variable.
2. Une formation plus franchement glacio-lacustre à sables et graviers lités est également atteinte au sud de Gland (Gland 02), à l'endroit où elle s'intercale avec la moraine de fond qui ressort sur les échines (Gland 01).

Répartition des sols

1. Sur le fluvio-torrentiel caillouteux

Les sols sont logiquement toujours très caillouteux au moins au-delà de 50 cm.

Sur les pentes fortes et moyennes, on trouve des PEYROSOLS calcaires de pente très filtrants en profondeur (unités 2715, 2710 lorsque le matériau brut apparaît à moins de 30 cm dans les pentes les plus fortes et les zones convexes).

Sur les glacis de pente faible des cônes les plus récents, les PEYROSOLS calcaires, profonds à très profonds (unité 2716), sont toujours très perméables (matrice sableuse grossière à très grossière autour des cailloux), mais leur horizon brun est en général plus épais.

Variantes comportementales

La très faible teneur en terre fine, surtout dans les horizons de profondeur, explique la très faible réserve hydrique de ce type de sols (2715) pourtant profonds et souvent bien enracinés. Une réserve calculée inférieure à 60 mm est possible dans les cas extrêmes. Cependant, la présence au-delà de 2 m de profondeur d'un horizon non caillouteux (colluvions, alluvions) ou imperméable (marne ou moraine de fond) peut modifier considérablement l'humidité de l'atmosphère du sol et assurer une alimentation complémentaire par condensation autour des cailloux (dans les horizons creux) ou remontées capillaires (horizons caillouteux à matrice sablo-silteuse). Les contraintes hydriques sont dans ce cas beaucoup plus discrètes ou même nulles.

Sur certains replats intermédiaires et sur les pentes modérées (inférieures à 10 %), on trouve des sols plus évolués (ou mieux conservés). Ils sont moins caillouteux en surface, profonds, non effervescents à l'acide au moins sur quelques décimètres (PEYROSOLS calciques, unité 2736) et bruns sur une plus grande profondeur.

La notation 2746 est adoptée quand un horizon profond est franchement rougeâtre. Le taux de cailloux diminue encore par dissolution progressive, ce qui dénote une évolution plus poussée. Le comportement hydrique est alors bien moins extrême que celui de l'unité 2715.

Sur Gilly, des sols de même origine fluvio-glaciaire sont même franchement lessivés (acides et à accumulation argileuse rouge de profondeur). Ce sont ces sols que l'on retrouve plus ou moins enfouis sous des colluvions variées dans les bas de Bursins.

2. Sur le sable glacio-lacustre lité (2315)

Vers le sud (les Echelettes, GLAND 02), on retrouve un matériau probablement glacio-lacustre, sableux, assez grossier et lité (2315). Le profil sain et non taché s'est cependant rapidement rempli d'eau courant mars 2001 et le comptage racinaire a dû être arrêté à 80 cm.

Terroirs viticoles vaudois

Description des unités de sol

Code cartographique: 2716

Secteurs : LC BV MO YV NY RO DZ AU MV OR LV

Situation topographique : cônes de déjection, pentes faibles

Géologie : moraines de retrait, glacio-torrentiel et éboulis de moraine en place ou en cônes de déjection

Légende carte : PEYROSOL de texture variable légère moyenne LSA/SL, + de 60% de charge grossière non triée dès la surface, terre fine calcaire (10-40% de calcaire total), horizon brun jusqu'à 80cm, enracinement souvent profond (P sup. à 1,50m), horizons profonds clairs et très sablo-caillouteux (80% de graviers galets blocs).

Caractéristiques moyennes

Prof. d'activité racinaire : sup. à 150 cm

Pierrosité	Couleur	Texture	Consistance	Calcaire	CEC
40-60%	brun	moy-légère	meuble	10-30%	6-8
70-90%	cailloux	grossière	meuble	5-30%	5-7

Enracinement limité par : perméabilité parfois excessive

0-50 cm	50-100 cm	100-150 cm	150-200 cm
4	2	2	1
R r ch	R r ch	R r ch abdt	R r ch var

Réserve estimée

RU max:	160 mm
RU mod:	100 mm
RU min:	70 mm

Variantes : 2706 Sol très brut sablo-caillouteux, clair dès la surface ou horizon brun inférieur à 40cm d'épaisseur, très creux, réserve globale inférieure à 70mm sur 2mètres
2715 Situations de pentes sous reliefs. 2715 ca Avec accumulation calcaire autour des cailloux
2715 S/2716 S Variantes très sableuses dès la surface
2722 Cas très particulier de sol très peu profond (40 cm sur cailloutis totalement encroûté par le calcaire)
2799 Zone mal identifiée en profondeur et type de sol des pentes fortes sous conglomérats de Lavaux


Commentaires : L'exploration racinaire est souvent très dense. La présence d'horizon creux (sans terre fine) peut empêcher la descente racinaire. Epierrage des plus gros cailloux.

Exemple de profil représentatif de l'unité




Prof [cm]	Horizons
0 - 50	Brun sombre, texture très légère, charge grossière moyenne (30% d'éléments grossiers), poreux, beaucoup de fines racines
50 - 160	Très caillouteux, de toutes tailles, à matrice sableuse calcaire, enracinement très développé autour des cailloux, quelques poches sableuses sans cailloux


Schéma



Profil racinaire [nb racines/dm]



Profil hydrique [mm/dm]



Réserve utilisable: 64 mm
Réserve potentielle totale: 67 mm
Réserve sur la prof. des racines: 67 mm

Terroirs viticoles vaudois

Description des unités de sol

Code cartographique: 2736

Secteurs : LC NY MO

Situation topographique : replats, cônes, pentes faibles

Géologie : éboulis ou cônes caillouteux stabilisés

Légende carte : PEYROSOL/CALCISOL de texture variable en surface (légère à moyenne), contenant + de 70% de charge grossière non triée au-delà de 50-70cm, non ou peu calcaires (0-10% de calcaire total) et un peu plus argileux dans l'horizon moyen, profonds (P 1,20m-1,80+).

Caractéristiques moyennes

Prof. d'activité racinaire : sup. à 150 cm

Enracinement limité par : horizon de profondeur, très filtrant

Réserve estimée

	Pierrosité	Couleur	Texture	Consistance	Calcaire	CEC
en surf.	20-60%	brun	moy-lourde	meuble	0-10%	7-12
en prof.	60-90%		légère	meuble	0%	moyenne

	0-50 cm	50-100 cm	100-150 cm	150-200 cm
Indice de RU [cm/50cm]	4	4	2	1
Racines	R r ch	R r ch	R r ch	R r ch var

RU max:	200 mm
RU mod:	110 mm
RU min:	90 mm

Variantes : 2735 Situations de pentes, en général plutôt issu de moraine très caillouteuse et terre fine variable en texture

2745/2746 Evolution encore plus nette avec présence d'un horizon moyen net et plus épais (plus argileux, plus rouge et très structuré), profond à très profond

Codes proches 2146 X

2755 Variante légèrement acide avec des cailloux altérés en profondeur et un léger enrichissement en argile. 2756 Très profond. 2755,4 Excès d'eau permanent en profondeur (horizon imperméable en dessous)


Commentaires : Toujours sains et profonds. Un épierrage des plus gros éléments ou des apports de surface peuvent baisser la pierrosité de surface.

Exemple de profil représentatif de l'unité




Prof [cm]	Horizons
0 - 60	Brun, texture moyenne, non calcaire sauf les cailloux, peu caillouteux, structure fragmentaire fine, enracinement abondant
60 - 90	Cailloutis sableux, calcaire brun clair avec nombreuses vermiculures d'accumulation calcaire, très fines racines abondantes (70% d'éléments grossiers)
90 - 140	Cailloutis sableux compact, à dominante d'éléments calcaires, fins chevelus encore abondants (80% d'éléments grossiers)


Schéma



Profil racinaire [nb racines/dm]



Profil hydrique [mm/dm]



Réserve utilisable: 96 mm
 Réserve potentielle totale: 96 mm
 Réserve sur la prof. des racines: 96 mm

Terroirs viticoles vaudois

Description des unités de sol

Code cartographique: 2315

Secteurs : LCLV BV MO DZ AU NY

Situation topographique : coteaux ou pentes moyennes

Géologie : fluvio-torrentiel ou glaciaire sableux très peu caillouteux

Légende carte : ARENOSOL calcaire de texture légère, 0-20% de charge grossière non triée, peu calcaire (10-20% de calcaire total), profond (P supérieure à 1,30m).

Caractéristiques moyennes

Prof. d'activité racinaire : sup. à 130 cm

Pierrosité	Couleur	Texture	Consistance	Calcaire	CEC
0-20%	brun	légère	meuble	10-30%	5-8
0%	beige	légère	meuble	20-30 %	faible

Variantes : 2315,1 Traces d'hydromorphie vers 80-90cm

2315,2 Excès d'eau temporaire en profondeur

2313 Limitation de profondeur par micro-litage horizontal et compacité de certains lits

2345,2 Variante contenant un horizon plus argileux brun-rouge, peu calcaire et excès d'eau au contact de la moraine

2316 Variante très profonde

2324 Possibilités d'encroûtements de calcaire pouvant bloquer l'enracinement

Commentaires : Au-delà de 30% de pierrosité, ces sols sont groupés avec la variante sableuse des moraines caillouteuses (2115 S) car ils ont les mêmes caractéristiques fonctionnelles.

Enracinement limité par : micro-litage horizontal de certains dépôts

0-50 cm	50-100 cm	100-150 cm	150-200 cm
5	5	4	4
R r ch	R r ch	R r ch	var

Réserve estimée


RU max:	180 mm
RU mod:	150 mm
RU min:	120 mm

Exemple de profil représentatif de l'unité




Prof [cm]	Horizons
0 - 60	Brun, calcaire, texture légère sableuse, peu caillouteux, peu compact, très bien enraciné bien qu'un peu tassé LAc
60 - 100	Brun olive, calcaire, texture moyenne légère à poches sableuses, 35% de graviers et cailloux de moraine, fines racines aplaties et chevelus abondants contre les cailloux, un peu compact, assez poreux (vers), mais pas de structure nette C
100 - 150	Sable olive à poches plus silteuses, très calcaire, peu caillouteux (15-20%), fines racines et chevelus se raréfiant (contre les cailloux) et un peu asphyxiés Mca


Schéma



Profil racinaire [nb racines/dm]



Profil hydrique [mm/dm]



Réserve utilisable: 114 mm
 Réserve potentielle totale: 136 mm
 Réserve sur la prof. des racines: 136 mm

7.4 SOLS ISSUS DE COLLUVIONS DE BAS DE PENTE

Rappels sur la roche mère

La terre arrachée par ruissellement aux pentes dépourvues de couverture végétale vient s'accumuler progressivement aux pieds des coteaux, en formant les colluvions. Les sols issus de ces colluvions (COLLUVIOSOLS) sont peu différents de leur matériau d'origine (les colluvions), car leur mise en place est très récente (périodes historiques). Nous excluons de cette référence les sols de pente supérieure à 3-4 %.

Principes de répartition des sols

Les sols sont très profonds, peu caillouteux, le plus souvent non calcaires (COLLUVIOSOL calcique, unité 9136).

Localement ils sont plus légers, non calcaires (variante 9236).

Ils sont parfois encore calcaires (COLLUVIOSOLS calcaires 9116) au piémont des pentes fraîchement érodées.

Comme signalé au paragraphe précédent, des sols anciens peuvent être enfouis sous des colluvions plus récentes : la notation 9146 a été adoptée pour les sols de Bursins qui présentent un horizon brun rouge enfoui, non calcaire et plus argileux (COLLUVIOSOL rubéfié, unité 9146) avec des cailloux altérés. Cette superposition s'est mieux comprise une fois la cartographie des sols de Gilly effectuée.

S'ils ont tous de très bonnes réserves hydriques, c'est leur drainage interne qui va les différencier : il varie entre la notation ,0 (sain) et ,4 (réductique).

- Le drainage est moyen vers BEGNI 06 et dans les points bas de la zone de Gland.
- Il devient franchement mauvais autour de BEGNI 07 qui se situe au débouché de la confluence de plusieurs combes. Des tracés d'anciens ruisseaux et des niveaux sourceux sont donc plus que probables.
- Le drainage général semble correct autour de Luins et de Bursins.
- Pour l'appellation Bursinel, le drainage des zones viticoles les plus basses semble meilleur vers Dully que dans le nord de la zone.

Les sols très variables, irrégulièrement érodés et colluvionnés des bordures de ruisseau sont affectés du code 9816 (NB : ce sont les seuls sols de la classe 9 qui peuvent être en situation de pente soutenue). Les sols sont calcaires, profonds et de composition variable suivant les apports des ruisseaux, souvent très remaniés et bouleversés. Nous ne positionnons pas de profils dans ces situations, qui, de plus, présentent fréquemment des variantes micro-climatiques liées à l'exposition et à l'écoulement d'air plus froid venant de l'amont.

9814 : unité de sols peu profonds des bordures de certaines ravines d'érosion. La molasse dure y est par endroit presque découverte (sorties de débris de plaques de grès).

Terroirs viticoles vaudois

Description des unités de sol

Code cartographique: 9116

Secteurs : LC MO AU NY BV YV DZ MV RO LV MV CH

Situation topographique : plaines, bas de pentes faibles colluvions récentes

Légende carte : COLLUVIOSOL calcaire, de texture variable moyenne à lourde, brun sur une grande profondeur, calcaire, profond (P sup. 1,30m), irrégulièrement caillouteux (0-30%), des bas de pente colluvionnés et/ou remantés, bien drainés.

Caractéristiques moyennes

Prof. d'activité racinaire : sup. à 130 cm

Enracinement limité par : néant

<i>en surf.</i>	<i>Pierrosité</i>	<i>Couleur</i>	<i>Texture</i>	<i>Consistance</i>	<i>Calcaire</i>	<i>CEC</i>
	0-30%	brun sombre	moy-lourde	meuble	modéré	10 à 20
<i>en prof.</i>	0-15%	brun	moy-lourde	peu compact	modéré	10 à 18

<i>Indice de RU [cm/50cm]</i>	0-50 cm	50-100 cm	100-150 cm	150-200 cm
Racines	r R	R r ch	r ch	r ch

Réserve estimée

<i>RU max:</i>	350 mm
<i>RU mod:</i>	300 mm
<i>RU min:</i>	200 mm

Variantes : 9216 Texture légère à légère moyenne, réserve hydrique réduite de 10 à 20%

9116,2/9116,1 À caractère rédoxique de profondeur

9116,3 Caractère rédoxique marqué dès 20-40cm

9114 Limitation locale de profondeur, présence possible de banc rocheux ou très gros blocs


9316 Calcaire, moyennement caillouteux (20-40%)

9346 Caillouteux à niveau calcique légèrement rubéfié

Exemple de profil représentatif de l'unité




<i>Prof [cm]</i>	<i>Horizons</i>
0 - 40	Horizon de texture moyenne, brun, à structure polyédrique, 10% de graviers et de cailloux arrondis mixtes, bien enraciné, bonne porosité, meuble, bonne activité biologique
40 - 160	Horizon brun, de texture moyenne, peu calcaire, bonne structure, 10-15% de graviers et de cailloux arrondis mixtes, très nombreuses racines dans la masse, peu compact, bonne activité biologique



Schéma

Profil racinaire [nb racines/dm]



Profil hydrique [mm/dm]



Réserve utilisable: 252 mm

Réserve potentielle totale: 252 mm

Réserve sur la prof. des racines: 252 mm

Terroirs viticoles vaudois

Description des unités de sol

Code cartographique: 9136

Secteurs : LC MO NY AU BV YV DZ MV RO LV MV CH

Situation topographique : bas de pentes/plaines

Géologie : colluvions de plaine

Légende carte : COLLUVIOSOL calcique de texture variable LSA/ALS calcique, profond (P sup. 1,30m), brun à brun sombre sur une grande profondeur, moyennement caillouteux (0-20%), des bas de pente colluvionnés, parfois recarbonaté en surface par apports.

Caractéristiques moyennes

Prof. d'activité racinaire : sup. à 120 cm

Enracinement limité par : néant

Pierrosité	Couleur	Texture	Consistance	Calcaire	CEC
0-10%	brun	moy-lourde	meuble	0-5%	10-22
0-10%	brun sombre	moy-lourde	meuble	0-10%	10-18

0-50 cm	50-100 cm	100-150 cm	150-200 cm
8	8	7	7
R r ch	R r ch	R r ch	R r ch

Réserve estimée
RU max: 350 mm
RU mod: 300 mm
RU min: 250 mm

Variantes : 9135 Colluviosol calcique profond et sain

9135,2 Colluviosol calcique à caractère rédoxique présent dès 60-80cm de profondeur. 9134,3 Colluviosol calcique à caractère rédoxique présent dès 40-60cm

9316 Colluviosol calcaire caillouteux (20-40% dès la surface). 9336 Colluviosol calcique caillouteux

9136,1 Variante calcique et très profonde présentant un excès d'eau temporaire en profondeur


9146 Présence d'un niveau rubéfié (rouge, peu ou non calcaire) enfoui. 9156 Colluviosol profond légèrement acide

Exemple de profil représentatif de l'unité




Prof [cm]	Horizons
0 - 50	Brun sombre, texture moyenne lourde, non calcaire, poreux, frais, meuble, bonne teneur en matière organique bien décomposée, structure fragmentaire assez nette LAcI
50 - 110	Transition très progressive, un peu plus clair, un peu moins structuré, mais toujours meuble, activité biologique moyenne, chenaux et pores enduits de revêtements plus sombres, 1 ligne de galets vers 110cm Aci
110 - 200	Peu différent, brun plus clair, un peu moins argileux, pas de structure visible, mais toujours une bonne porosité d'origine biologique, les fines racines visibles sont mortes Cci


Schéma



Profil racinaire [nb racines/dm]



Profil hydrique [mm/dm]



Réserve utilisable: 327 mm

Réserve potentielle totale: 327 mm

Réserve sur la prof. des racines: 327 mm

7.5 RÉPARTITION DES SOLS DU SECTEUR

Code	surf en ha	%
2114	30,3	10%
2115-2124	14,6	5%
2135-2136	19,6	7%
2315	9,1	3%
2413-2414	51,1	17%
2415	7,0	2%
2434-2435	5,9	2%
2706-2716	29,1	10%
2736	8,1	3%
2746	2,9	1%
3115	2,6	1%
9116	18,6	6%
9136	77,0	26%
9146	2,1	1%
9813-9814-9816	15,5	5%
totaux	293,5	




Figure 12 : Surfaces et pourcentages de répartition des sols par code sur le secteur




Figure 13 : Proportion d'hydromorphie


8. LE COMPORTEMENT HYDRIQUE DES SOLS DU SECTEUR

8.1 LES PRINCIPAUX PROFILS HYDRIQUES DES SOLS DU SECTEUR


L'annexe 4 présente les principaux profils hydriques du secteur côte à côte. Cette planche comparative permet ainsi de voir la variation des réserves hydriques selon les sols.

La répartition des sols en fonction de leur réserve utilisable en eau et de leur profondeur d'enracinement met en évidence cinq grands groupes :


Groupe 1 : ensemble de sols à réserve utilisable faible à moyenne répartie sur plus de 150 cm de sol. Les 50 premiers cm présentent une réserve décimétrique moyenne, puis les niveaux sablo-caillouteux plus en profondeur ne stockent que très peu d'eau, retenue faiblement autour des grains de sables et des silts grossiers. Les sols les plus évolués présentent des niveaux à enrobage plus argileux capables de retenir un peu plus d'eau.




Groupe 2 : sol à réserve faible à moyenne, répartie sur moins d'un mètre de profondeur. L'eau est moyennement retenue, la réserve décimétrique est forte et régulière sur les 70 premiers cm. Ces sols assurent une bonne disponibilité de l'eau au printemps, mais ne possèdent pas de réserve en profondeur.




Groupe 3 : sol à réserve en eau moyenne, répartie sur 150 cm. L'eau est moyennement retenue, la réserve décimétrique est forte et régulière sur 1m puis décroît progressivement jusqu'à 150 cm (présence croissante de cailloux). Ces sols profonds assurent une bonne disponibilité en eau au printemps, relayée par une réserve moyenne en profondeur.



Groupe 4 : sol à forte réserve en eau, répartie sur 150 cm. L'eau est moyennement retenue, la réserve décimétrique est forte et régulière sur 1 m puis décroît progressivement jusqu'à 150 cm. Ces sols, profonds, assurent une bonne disponibilité en eau au printemps et possèdent une réserve de profondeur moyenne.



Groupe 5 : ensemble des sols très profonds, de texture moyenne sans cailloux, à très fortes réserve en eau. L'eau est moyennement retenue, la réserve décimétrique est très forte et répartie régulièrement sur 2 m de profondeur. Ces sols assurent une alimentation en eau permanente sur tout le cycle végétatif.



Ces grands groupes de sol aux caractéristiques hydriques proches (au moins d'un point de vue quantitatif) sont représentés à la figure 14. Ces regroupements doivent être nuancés par :

- la texture de la terre fine qui influe sur les forces de rétention de l'eau dans le sol (en période de niveaux bas des réserves hydriques - 10 à 20% de remplissage);
- les types d'hydromorphie, qui trahissent toujours une ambiance plus humide en profondeur ainsi que de possibles compléments d'alimentation en eau (par écoulements latéraux ou par capillarité). Les conséquences plus ou moins néfastes des excès d'eau sur l'état des racines et l'asphyxie du sol dépendent des millésimes qui pilotent la durée de l'engorgement et de leur succession dont dépend le développement ou le dépérissement de l'architecture racinaire;
- la contribution, très difficile à estimer, de bancs rocheux en plaques très inclinées, poreux gypseux ou argileux;
- la contribution d'horizons encore plus profonds que ceux pris en compte, les ruissellements latéraux profonds (sur roche non fissurée, marne ou moraine de fond), les condensations "occultes" autour des cailloux, etc.




Figure 14 : Répartition des sols en fonction de leur réserve utilisable et de leur profondeur d'enracinement

8.2 LA RÉSERVE HYDRIQUE DES SOLS DU SECTEUR

La variabilité des réserves hydriques des sols viticoles peut s'échelonner entre 40 et 300 mm. Pour prendre en compte cette variabilité, il est préférable de choisir une méthode qui permette de réaliser rapidement un nombre élevé d'observations. Souvent profonds, caillouteux ou rocheux, ces sols se prêtent mal à des caractérisations précises, qui ne sont évidemment pas exclues.

Un outil de calcul et de représentation rapide a donc été mis au point. Utilisée depuis 1999 dans le cadre des études de terroirs, cette méthode permet une bonne représentation de la notion de réserve hydrique, fondamentale dans la compréhension des terroirs viticoles. Accompagnée d'un schéma de description, cette représentation permet de mémoriser facilement les grandes caractéristiques des sols et leur interprétation (fig. 15). Cet outil permet par ailleurs de visualiser rapidement la répartition et la quantité d'eau utile dans le sol.

Calcul de la réserve utile

$$RU \text{ (en mm d'eau)} = PU * Te * (1 - Cx)$$

PU : profondeur utilisée

Te : coefficient textural (sable grossier:0.5 à silt argileux sain: 2)

(1 - Cx) : pondération du taux de graviers / cailloux




Figure 15 : Calcul de la réserve utile

Le préalable est bien évidemment l'ouverture d'un profil pédologique "en situation", étape essentielle en matière d'explication et de raisonnement, qui ne peut être remplacée par aucune mesure indirecte.

Principes de calcul

Le calcul se fait par tranche fixe de 10 cm pour s'affranchir de la notion d'horizons d'épaisseurs variables et permettre d'intégrer des variations rapides de texture, pierrosité, etc. Pour chaque tranche de sol, les paramètres suivants sont nécessaires : la texture, le pourcentage de cailloux et graviers, les comptages racinaires et enfin un coefficient de colonisation racinaire. Ce coefficient racinaire n'est valable que pour des vignes assez âgées de façon à ce qu'elles soient bien en place. Le calcul automatique des réserves et la représentation instantanée des graphes racinaires et hydriques peuvent se faire rapidement par une application informatique simple (voir les fiches de profils à l'annexe 1).

Les coefficients racinaires utilisés sont les suivants :

- 1 = bonne répartition, densité correcte
- 0,5 = faible densité ou racines mal réparties (grosses zones sans racines)
- 0,1 = juste quelques chevelus ou fines racines, parfois en mauvais état
- 0 = aucune racine vue.

La méthodologie détaillée du calcul de la réserve hydrique figure à l'annexe 5.

Réserve utile modale estimée des sols du secteur

La mise en valeur des réserves hydriques des sols, calculée selon la méthode décrite ci-dessus, a permis d'établir la carte représentant la réserve hydrique utile pour chacun des secteurs : **voir figure 17.**

Cette carte a été établie sur la base des données présentes pour chaque unité de sol du secteur, en les traitant de façon modale, c'est-à-dire en prenant la valeur la plus fréquente et non la valeur moyenne. Les réserves utiles ainsi représentées ne tiennent compte ni des variantes de sol, ni de l'hydromorphie; elles donnent cependant une bonne valeur indicative du potentiel de réserve en eau des sols, utile pour la vigne.

La figure 16 ci-dessous présente la répartition des réserves hydriques en pourcentage de la surface du secteur.





Figure 16 : Répartition des réserves hydriques en % de la surface du secteur

Figure 17 : Carte des réserves hydriques des sols du secteur



9. CONCLUSIONS

Le sol est un élément important du terroir, mais d'autres paramètres peuvent influencer le comportement de la vigne. Rappelons pour mémoire les grandes différences de pentes et d'orientations, les effets d'ombrages, d'abri ou au contraire d'ouverture aux vents dominants ou aux écoulements d'air gravitaires plus locaux en provenance des reliefs.

On peut cependant dégager des particularités purement pédologiques dans la nature et la répartition des sols rencontrés dans ce secteur. On se remémorera les nuances des différents profils en consultant la planche de schémas de l'annexe 3.

Dans les pentes, le substrat morainique, caillouteux ou non, est en général compact. Dans les pentes soutenues, l'enracinement n'est souvent que moyennement profond car l'érosion y amincit le sol meuble et peu protégé de cailloux, surtout avant que l'enherbement soit mis en place de façon quasi généralisée. Les catégories 2113-2114 et 2413-2414 dominent et représentent plus de 30 % des surfaces.

Dans les pentes plus modérées, les sols issus de moraine évoluent vers une plus grande profondeur et prennent alors un caractère calcique.

Plusieurs cônes ou replats fluvio-glaciaires bien marqués (ainsi que leurs bordures) portent des sols extrêmement gravelo-caillouteux : plus de 40 hectares sont concernés par les codes 2710 à 2746.

La zone pilote de La Côte présente sans conteste le plus grand nombre de sols viticoles de types colluviaux. Les catégories 91.. de plaine et de bas de très faibles pentes représentent près de 25 % des surfaces (hormis l'unité 9816 qui peut remonter dans les pentes le long des ruisseaux).

Plus de la moitié des surfaces (157 ha) sont affectées d'un manque d'oxygénation temporaire des horizons moyens, plus ou moins marqués par des taches dans le sol (hydromorphie), soit par excès d'eau temporaire, soit par manque de porosité, soit pour les deux raisons associées. Plus de la moitié de ces cas sont liés à la compacité de la moraine et se produisent dans les pentes, même fortes. Ils sont alors combinés à un enracinement assez superficiel, ce qui engendre paradoxalement des contraintes parfois sévères dans l'alimentation hydrique (2113,1 - 2114,1 - 2413,1). Dans l'autre moitié des cas, ce sont de véritables excès d'eau par arrivées latérales importantes (2xx4,2 ou 2xx3,3), ou dus à des nappes perchées temporaires (9xx5,2 ou 9xx4,3).

En certains endroits, des lits plus sableux dans la moraine de fond jouent le rôle de véritables « drains naturels » qui ressortent en surface un peu plus bas (mouilles, parfois même sorties d'eau sous pression après de fortes pluies). Le même phénomène s'observe à la limite entre les chapeaux graveleux (2710 ou 2716) et les pentes morainiques compactes plus basses (2114,2 ou 2414,2).

Des drainages très importants (à 2 m de profondeur) ont été effectués avec un résultat certain dans quelques coteaux (Château de Vinzel).

De très anciens chenaux emplis de grosses pierres ont été aménagés dans les pentes de moraine très compacte, permettant ainsi de régulariser le comportement hydrique. Ils sont parfois trahis par l'apparition de bandes régulières dans la végétation, les souches au droit des drains ayant un enracinement mieux développé que les autres.

10. GLOSSAIRE ET BIBLIOGRAPHIE

10.1 GLOSSAIRE DES NOMS DE SOLS

Les grands ensembles de référence sont toujours notés en majuscules

ARENOSOL	: sol contenant moins de 12.5 % d'argile et plus de 65 % de sables sur toute sa profondeur. Horizon brun de plus de 10 cm, pas d'horizon fortement différencié.
BRUNISOL	: sol peu acide ou acide présentant un horizon de profondeur, brun très bien structuré et très poreux.
CALCOSOL	: nouvelle dénomination du « sol brun calcaire » contenant plus de 5 % de calcaire total, faisant plus de 40 cm d'épaisseur au-dessus de la roche mère, avec un horizon «S» (= structural) moyen différent (couleur, texture, teneur en calcaire) de la roche mère calcaire.
CALCISOL	: nouvelle dénomination du « sol brun calcique ou à stock de calcium » qui présente au moins un horizon moyen saturé en calcium mais non ou très peu effervescent à l'acide chlorhydrique (qui ne contient plus de calcaire total).
COLLUVIOSOL	: sol issu de colluvions, matériaux arrachés aux pentes dominantes (nous utilisons un sens restrictif : colluviosol de plaine ou bas de pente).
FERSIALSOL	: sol évolué présentant un horizon FS, rouge assez vif et de structure fine anguleuse (micro-polyédrique) très stable, souvent plus argileux que les autres horizons du profil, (re)carbonaté ou non (témoin de climat de type méditerranéen à saison chaude et sèche de la période moins 5 à 6'000 ans).
FLUVIOSOL	: sol peu évolué, développé sur alluvions fluviales récentes et situé en position basse de vallée actuelle.
LUVISOL	: sol acide présentant une nette différenciation des horizons par lessivage des argiles vers la profondeur.
LITHOSOL	: sol très mince, limité en profondeur par un matériau cohérent, dur et continu (roche non altérée ou horizon durci), situé à moins de 10 cm de la surface.
PEYROSOL	: sol contenant plus de 60 % d'éléments grossiers, cailloux, pierres (sens large : nous incluons les graviers : terre fine < 40 %).
REGOSOL	: sol très mince comportant un horizon non ou très peu évolué, meuble ou peu dur (moraine ou dépôt fluvio-glaciaire), situé à moins de 30-40 cm après mise en culture (10 cm en conditions naturelles).
RENDOSOL	: sol mince calcaire, horizon Aca calcaire d'épaisseur inférieure à 30-40 cm sur roche calcaire non transformée.
RENDISOL	: sol mince calcique, horizon Aci calcique d'épaisseur inférieure à 30-40 cm sur roche calcaire non transformée.

Quelques qualificatifs d'horizons ou de sol

Calcaire	: faisant effervescence à HCL à froid, donc calcaire (plus de 5% de calcaire total).
Calcique	: ne fait pas effervescence à HCL à froid, donc moins de 5% de calcaire total, mais saturé par le calcium donc de pH neutre ou basique (attention : ce terme présente des acceptions diverses).
Calcarique	: accumulation de calcaire secondaire (revêtements amas, pseudomycéliums).
Calcarique continu	: accumulation calcaire continue non indurée (pénétrable).
Péto-calcarique	: accumulation calcaire continue et indurée - croûte.
Eluvial	: horizon appauvri en argile et en fer.
Illuvial	: horizon d'accumulation.
Pierrique	: taux de pierre (taille entre 7,5 cm et 20 cm) supérieur à 40 %.

- Cailloutique : taux de cailloux (taille entre 2 cm et 7,5 cm) supérieur à 40 %.
- Rédoxique : plages ou traînées grises et taches rouilles enrichies en fer- mauvais drainage temporaire.
- Réductique : couleur uniformément bleuâtre ou grisâtre- mauvais drainage généralisé, excès d'eau permanent en profondeur.

On comprend que, pour les sols issus de moraines, les passages entre CALCOSOLS cailloutiques - CALCISOLS recarbonatés - PEYROSOLS calcaires - ARENOSOLS calcaires cailloutiques ou RENDOSOLS sont très progressifs.

10.2 ABRÉVIATIONS DES HORIZONS UTILISÉES DANS LES FICHES DE DESCRIPTION

Préfixe L : tout horizon mis en culture (Labour ou minage)

Préfixe Z : horizon profondément modifié (présence de briques, remblai, charbons, etc.)

Horizons de références

A : horizon brun de surface, contenant de la matière organique incorporée à la matière minérale et présentant une structure d'origine biologique.

LAca : horizon A cultivé calcaire.

LAci : horizon A cultivé calcique.

LAg : horizon A cultivé à taches rouilles.

LA/S : horizon cultivé mélangeant deux horizons naturels.

E : horizon éluvial acide et appauvri en argile.

LE : horizon cultivé de surface appauvri en argile.

J, Js : horizon jeune de surface et peu différencié, faiblement organique.

S : (anciennement Bs) horizon structural d'altération pédologique, moins brun que A, présentant une structure pédologique généralisée – présence biologique nettement plus faible qu'en A.

Sca : horizon structural (s) calcaire.

Sci : horizon structural (s) calcique.

(B) : horizon présentant une légère accumulation relative d'argile.

Bt : horizon d'illuviation d'argile, avec revêtements argileux sur certaines surfaces.

Bt-fs : horizon d'illuviation d'argile et de couleur brun rougeâtre.

K : horizon pétrocalcarique de croûte calcaire dure.

G : horizon réductique à engorgement quasi-permanent (ou Gr).

Go : horizon réductique temporairement réoxydé.

C : horizon minéral de fragmentation de la roche mère, accompagnée d'une certaine altération géochimique. On reconnaît la structure de la roche (litage, etc).

Cca : horizon C avec dépôts de CaCO₃.

M : roche mère meuble, non ou peu caillouteuse.

Mca : roche mère meuble, calcaire (moraine ou marne).

D : roche mère pseudo meuble de matériaux durs fragmentés et transportés - éléments grossiers dominants.

Dx : D avec éléments grossiers mixtes.

Dca : D avec éléments grossiers calcaires.

Dxca : D avec éléments grossiers mixtes, calcaires dominants.

R : roche mère dure massive ou peu fragmentée.

Rca : roche calcaire.

Z : horizon remanié (présence de briques, remblai, charbons, etc.).

Lettres suffixes pouvant être accolées aux horizons

-fs : coloration rouge à brun rougeâtre et structuration micro-polyédrique.

(g) : traces rédoxiques, S(g), Sca(g) Bt(g), etc.

g : horizon rédoxique bariolé rouille gris, Eg, Sg, Scag, Cg, Mg, etc.

h : qualifie un horizon plus organique et plus sombre que la normale.

H : horizon très noir.

x, X : qualifie un horizon très caillouteux.

k : accumulation calcaire non indurée.

Profils Complexes

1, 2, 3 : superpositions verticales d'horizons A1, A2...

I, II, III : indiquent la première, seconde et parfois troisième origine des horizons ou roches mères. Ex : LA_{xca} / ID_{ca} / IIM indique une superposition d'un peyrosol calcaire de cailloutis (Dca : 1^{ère} roche mère) sur une moraine de fond (IIM : 2^{ème} roche mère qui a son importance).

10.3 LEXIQUE

Acide	: Caractéristique chimique d'un sol dont le pH de l'eau est inférieur à 6,5 (contraire = basique).
Activité biologique	: Traces de vie des animaux qui se trouvent dans un sol.
Agrégat	: Désigne un petit fragment de terre (motte).
Alluvion	: Sédiment récent ou ancien déposé par un cours d'eau ou un lac, de composition variable (pierres, graviers, sables, silts, argiles, calcaires ou non).
Altération	: Transformation progressive physique et chimique d'une roche en résidu (altérite).
Argile	: Particule très fine. Les argiles présentent des propriétés très différentes selon leur nature.
Argillification	: Accumulation relative d'argile dans les horizons profonds d'un sol.
Argilane	: Revêtement argileux sur les faces des éléments de la structure.
Badlands	: (anglais-mauvaises terres) paysage où la faible végétation et le ruissellement important ont contribué à la formation de profondes ravines (pentes de roches meubles : argiles, marnes, gypse) en région sub-désertique ou en région plus humide, par suite de la destruction par l'homme du couvert végétal.
CA	: Calcaire actif.
Calcaire	: Type de roche OU carbonate de calcium OU adjectif de type de sol OU d'Horizon.
Calcaire (Hor)	: Horizon contenant plus de 5% de carbonates (en gros calcaire total); effervescent à froid à HCl.
Calcique (Hor)	: Horizon saturé contenant moins de 5% de carbonates (en gros calcaire total); pas d'effervescence à froid à HCl ou très localement.
CEC	: Capacité d'Echange Cationique : mesure de l'aptitude des sols à retenir les cations (potassium, magnésium, calcium...).
Concrétions	: Accumulations minérales ou métalliques (calcaire, fer...) autour d'un noyau ou sur une surface. Lorsque ces concrétions sont très nombreuses et cimentées, elles prennent l'aspect de mâchefer ou de croûte.
Conglomérat	: Roche dure, formée de graviers et cailloux roulés ou non, cimentés (par du calcaire ou de la silice).
Colluvions	: Accumulation de matériaux au bas des pentes par gravité et ruissellement.
CT	: Calcaire total.
Cuesta	: Terme géographique, désignant une côte bien marquée dans le paysage.
Décarbonatation	: Perte progressive du calcaire total (donc actif) de la terre fine. Contraire : recarbonatation (par les eaux, l'érosion des pentes dominante, l'homme).
Déferriée	: Evolution d'une argile qui perd son fer (milieu acide et/ou très engorgé).
Détritique	: Formation résultant de la désagrégation de roches.
Doline	: Dépression fermée, formée dans le calcaire dur.
Drumlin	: Forme de modelé glaciaire - Colline allongée suivant l'écoulement de la glace.
Effervescence	: Réaction à l'acide. S'il y a effervescence, le sol est calcaire et très basique. Sinon il est modérément basique, neutre ou acide.
Encroûtement calcaire	: Niveau induré lié à des précipitations de carbonates de calcium (calcaire).
Eolien	: Dû à l'action du vent (apports éoliens = lœss).
Faciès	: Caractéristiques d'une roche.
Faille	: Cassure de terrain avec déplacement des parties séparées.
Ferro-Manganique	: Eléments noirs (fine pellicule ou grain) constitués de fer et de manganèse qui se déposent ensemble quand le sol est sujet à un excès d'eau prolongé (signes parfois fossiles).

Ferrugineux	: Contenant du fer.
Fersiallitique	: Se dit d'un sol à horizon de couleur rouge où les argiles sont liées au fer ferrique et à la structure micro-polyédrique.
Flysch	: (d'un nom suisse : terrain qui glisse) formation sédimentaire épaisse formée en delta sous-marin, de composition variable mais rythmée (graviers/blocs-sables-silts-argiles litées) souvent impliquée dans les nappes de charriage lors de la formation des Alpes.
GEPPA	: Groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (triangle de texture utilisé).
Glauconie	: Minéral argileux d'origine marine, de couleur verte, riche en fer (grains dans les roches).
Gley	: Horizon de couleur généralisée gris vert indiquant un engorgement permanent.
Grès	: Roche sédimentaire dure et rugueuse formée de grains cimentés (calcaire ou non).
Grèze	: Accumulation de graviers ou de cailloux calcaires.
Gypse	: Sulfate de calcium hydraté: minéral blanc, peu dur, soluble dans l'eau, ne faisant pas effervescence à l'acide, rayable à l'ongle et formé dans des lagunes (trias ou oligocène du Chablais). Aspect de sucre ou de gros cristaux.
Humus	: Fraction du sol provenant de la décomposition et de la polymérisation de la matière organique.
Hydromorphe	: Se dit d'un sol qui présente des signes attribuables à un excès d'eau permanent ou temporaire (hydromorphie).
Illite	: Argile de taille moyenne, proche du mica. C'est la plus répandue. CEC moyenne.
Interfluve	: Région située entre deux cours d'eau.
Kaolinite	: Argile de petite taille, peu gonflante, assez répandue, faible CEC.
Karst	: Paysage typique des régions calcaires - dolines, vallées sèches, gouffres, rivières souterraines - formé par la dissolution du calcaire par les eaux.
Fluvio-glaciaire	: Sédiments transportés par les glaciers puis repris par des cours d'eau.
Lamellaire	: Feuilleté.
Lessivé	: Se dit d'un sol acide dont les argiles migrent vers le bas. L'horizon supérieur devient clair et sableux.
Lœss	: Dépôt sédimentaire meuble et fin, bien trié, d'origine éolienne, calcaire et souvent très poreux.
Limon (silt)	: Particule de taille moyenne. Les limons ont tendance à être battants (déstructurés par la pluie). Synonyme de silt pour nous. La notion agronomique de limon "terre de texture moyenne" n'est jamais utilisée car trop ambiguë et pouvant inclure des textures sablo-argileuses sans aucun "limon" textural.
Lité - litage	: Déposé en lits superposés.
Lithochrome	: Qualifie un horizon dont la couleur est héritée de la roche mère et non due à l'évolution pédologique.
Lithologie	: Nature des roches.
Marne	: Roche sédimentaire non indurée à grains fins, effervescente à l'acide dilué, mélange d'argile et de calcaire, moins compacte que les calcaires, moins plastique que les argiles, de débit, couleur et composition variables.
Matière organique	: Substance provenant de débris végétaux ou animaux.
Mica	: Minéral brillant, se débitant en lamelles.
Minéralisation	: Transformation de la matière organique en minéraux (nitrates) assimilables par la plante.
Molasse	: Formation sédimentaire à faciès variés (sables, marnes, conglomérats, grès) de l'ère tertiaire.

Moraine	: Eléments de toutes tailles, arrachés, éboulés ou déposés sur et sous un glacier, puis transportés ou compactés par lui. Dépôts constitués par ces éléments: moraines latérales, de fond, frontales.
Nappe alluviale	: Nappe d'eau libre plus ou moins profonde en relation avec une rivière.
Nappe perchée	: Nappe d'eau développée au-dessus d'un niveau peu ou pas perméable.
Oxydation (taches)	: Taches de rouille, formées par réaction chimique entre le fer et l'oxygène (contraire : réduction, taches grises).
Pélite	: (du grec pélos boue) toute roche sédimentaire détritique à grain très fins (cohérente ou non), faisant pâte avec l'eau et contenant des argiles et des silts carbonatés ou non en proportion dominante.
Pisolite	: Gravier de la taille d'un pois et recouvert de fer.
pH	: Mesure indiquant le degré d'acidité du sol – pH = potentiel d'Hydrogène.
Polyédrique	: Structure fragmentaire caractérisée par des agrégats à faces nombreuses et planes, à arêtes anguleuses.
Piémont	: Pente douce en bas d'un relief montagneux ou d'un massif.
Pierrosité	: Quantité d'éléments grossiers mélangés à la terre fine.
Pores	: Espace vide du sol (porosité = ensemble des vides).
Prisme (prismatique)	: Petite motte de terre de forme rectangulaire, allongement plutôt vertical.
Pseudogley	: Taches de rouille, nombreuses, indiquant un engorgement périodique.
Pseudomycélium	: Précipitation diffuse du calcium en forme de filaments de couleur blanchâtre (= vermiculure, persillage).
Quartz	: Minéral siliceux, dur, translucide, incolore ou rosé.
Recarbonaté	: Rechargé en calcaire. Se dit par ex. d'un sol à horizon calcique recouvert d'un horizon calcaire à la suite d'apports récents naturels ou non. Contraire : décarbonaté.
Revêtement	: Pellicule d'argile ou de fer qui recouvre l'extérieur d'une petite motte de terre (polyèdre ou prisme) ou d'un cailloux.
Roche mère	: Matériau à partir duquel le sol se forme.
RU réserve utile	: Quantité d'eau qu'un sol peut potentiellement mettre à la disposition de la plante.
Rubéfaction	: Type d'évolution du sol sous climat chaud qui le rend rouge par déshydratation des oxydes de fer (hématite).
Sable	: Particule de grosse taille mais inférieure à 2 mm. Il est utile de distinguer les sables fins (<0.2 mm) et les sables grossiers pour les calculs de réserve hydrique.
Schiste	: Sens large : toute roche qui se débite en feuillets. Sens strict : roche métamorphique ayant acquis un débit en feuillet sous l'effet de contraintes tectoniques (pression). Les micas sont souvent orientés, les surfaces des feuillets satinées ou soyeuses.
Silt	: voir limon.
Structure	: Mode d'assemblage d'un sol - un sol bien structuré est composé de mottes de terre de forme irrégulière et fragmentées et n'a pas un aspect massif.
Substrat	: Formation située en dessous du sol.
Talweg	: Ligne de fond d'un vallon ou d'une vallée, suivie par le cours d'eau quand il en existe un.
Texture	: Composition d'un sol selon les proportions de sable, limon et argile. Exemple: argilo-sableux, limono-argileux, sablo-limoneux, etc en référence à un triangle de texture donné (GEPPA est le plus proche des perceptions de terrain).
Tectonique	: Terme désignant un ensemble de déformations (cassures, plissements, etc.) affectant les terrains géologiques.
Topographie	: C'est le relief. La forme du terrain est représentée sur une carte par des lignes de même altitude (courbe de niveau). Une situation topographique est un type de relief bien reconnaissable; exemple : cuvette, butte, versant, vallée, etc.
Toposéquence	: Chaîne de sols logiquement liée au relief.

- Vallum morainique : Forme de modelé glaciaire – colline en croissant concave vers l’amont qui marque la limite maximale d’avancée d’un glacier (moraine frontale).
- Varve : Dépôt finement lité d’origine lacustre.
- Vertique : Se dit d’un sol composé d’argiles très gonflantes; dans ces argiles gonflantes, les côtés de chaque motte de terre sont lisses et luisants. Les CEC y sont très élevées

10.4 BIBLIOGRAPHIE

Sols - Pédologie

- SOLTNER D., 2002 - Les bases de la production végétale. Tomes 1 & 2. Editions Sciences et Techniques Agricoles.
- SOLTNER D., 2002 - Les Techniques Culturelles Simplifiées. Editions Sciences et Techniques Agricoles.
- BAIZE D., 1998 - Guide des analyses courantes en pédologie. INRA Editions.
- BAIZE D., Jabiol B., 1995 - Guide pour la description des sols. INRA Editions.
- OUVRAGE COLLECTIF, 1995 - REFERENTIEL PEDOLOGIQUE. INRA EDITIONS.
- GOBAT J.-M, ARAGNO M., MATTHEY W., 1998 - Le Sol vivant. Presses polytechniques et universitaires romandes.
- STENGEL P., GELIN S., COORD., 1998 - SOL INTERFACE FRAGILE. INRA EDITIONS.
- DUCHAUFOR PH., 1991 – PEDOLOGIE. Masson.
- CALLOT G., CHAMAYOU H., MAERTENS C., SALSAC L., 1982 - Les interactions sol – racines. INRA EDITIONS.

Géologie

- SERVICE HYDROLOGIQUE & GEOLOGIQUE FEDERAL, Atlas géologique de la Suisse - cartes 1:25'000.
- CHAROLLAIS J., BADOUX H., 1990 - Guides géologiques régionaux – Suisse lémanique, Pays de Genève et Chablais. Masson.
- FOUCAULT A. & RAOULT J.-F, 1995 - Dictionnaire de géologie. Masson.
- CAMPY M. & MACAIRE J.-J., 1989 - Géologie des formations superficielles. Masson.

Viticulture

- CHAMPAGNOL F., 1985 - PHYSIOLOGIE DE LA VIGNE. Champagnol, 34980 Saint-Gely-du-Fesc.

Histoire de la terre - paysages

- PACCALET Y., 1991 - La Terre et la Vie. Larousse.
- PIGEAT J.-P., 2000 - PAYSAGES DE LA VIGNE. SOLAR.
- AMBROISE A., FRAPA P., GIORGIS S., 1999 - PAYSAGES DE TERRASSE. Edisud.

11. ANNEXES**ANNEXE 1 : FICHES DE DESCRIPTION DES PROFILS DE SOLS**

22 profils ont été creusés sur le secteur.

N° de profil	Commune	Lieu-dit	Code cartographique*	Page
BURSL.01	Bursinel	Le Grand Clos	2433,2	73
BURSL.02	Bursinel	Chavannes	9135,2 R	74
DULLY.01	Dully	Bourg d'Amont	2413,1	75
DULLY.02	Dully	Es Jonchères	2736	76
BURSI.01	Bursins	Bursins	9146/27	77
BURSI.02	Bursins	St-Vincent	2736	78
VINZE.01	Vinzel	Blanche Vigne	2135	79
VINZE.02	Vinzel	Trois Carreaux	2114/2115	80
VINZE.03	Vinzel	Derrière la Maison	3115/2115	81
VINZE.04	Vinzel	Les Chaponnières	2115	82
LUINS.01	Luins	Capite	2413,1	83
LUINS.02	Luins	Perrailon	2715	84
LUINS.03	Luins	Corneaux	2413,1	85
BEGNI.01	Begnins	Les Cottes	2135,1 SX	86
BEGNI.02	Begnins	La Clodiaz	2114,1	87
BEGNI.03	Begnins	Combe Vallière	2413,1 DX	88
BEGNI.04	Begnins	Fleuri	2735	89
BEGNI.05	Begnins	Sein-Dené	2135 X(+)	90
BEGNI.06	Begnins	Courson	9135,3	91
BEGNI.07	Begnins	Les Grâces	9134,4	92
GLAND.01	Gland	Les Sâles	2413,1	93
GLAND.02	Gland	Echelettes	2315	94

*Le système de codification est expliqué au chapitre 4.2.

Description des profils de sol

N° profil: BURL-01

Localisation

Commune : Bursinel
Lieu-dit : Le Grand Clos
Date : 01.03.2001
Observateur : C. Fermond et V. Zufferey
Position : milieu de pente
Pente : 5-10%, régulière

Environnement

Roche mère : moraine de fond compacte
Etat de la roche : moraine de fond très compacte, limoneuse fine, bariolée, rares dragées
Hydrologie : excès d'eau temporaire
 ruissellements latéraux, compacité du sous-sol

Antécédents climatiques : pluie et neige faibles les jours précédents
Végétation / Cépage : Chasselas / 3309
Erosion et battance : ni érosion, ni battance

Description




Prof [cm]	Horizons
0 - 60	Brun olive, non calcaire, texture moyenne, structure continue se fragmentant en polyédrique peu nette, porosité biologique, beaucoup de racines horizontales, 15% d'éléments grossiers <i>LAc1</i>
60 - 90	Limon argileux compact à plages grises bariolé rouille, calcaire, porosité non visible, racines en mauvais état sanitaire, fines racines et chevelus abondants, rédoxique <i>Sca</i>
90 - 130	Moraine de fond compacte en place, très rares fines racines pourries au sommet, bariolé rouille gris peu contrasté <i>Mca</i>


Schéma



Profil racinaire [nb racines/dm]



Profil hydrique [mm/dm]



Réserve utilisable: 138 mm
 Réserve potentielle totale: 212 mm
 Réserve sur la prof. des racines: 173 mm

Analyses de terre [Sol-Conseil]

Prof [cm]	Argiles [%]	Silts [%]	Sables [%]	MO [%]	pH	CaCO3 tot [%]	Ca act [%]	Fe [ppm]	IPC [-]	Salinité [mg/100g]	CEC _m [%]	Ca [%]	Mg [%]	Na [%]	H [%]
10-50	21.9	43.2	34.9	1	8	1				36.1	81	1.9	6.3	0.9	10
60-90	28.3	62.2	9.5	0.3	8.3	26	11.8	144	5.7	37.8	94	0.7	4.7	0.9	0

Synthèse générale

Code cartographique : 2433,2

CALCISOL moyennement profond, rédoxique, de pente faible, sur moraine de fond compacte non caillouteuse, 2433,2

Description des profils de sol

N° profil: BURSLS-02

Localisation

Commune : Bursinel

Lieu-dit : Chavannes

Date : 01.03.2001

Observateur : C. Fermond et V. Zufferey

Position : bas de pente

Pente : 2-5%, régulière

Environnement

Roche mère : moraine de fond compacte

Etat de la roche : moraine de fond très compacte, limoneuse fine, bariolée, rares dragées

Hydrologie : excès d'eau temporaire

ruissellements latéraux, compacité du sous-sol

Antécédents climatiques : pluie et neige les faibles jours précédents

Végétation / Cépage : Chasselas / 3309

Erosion et battance : ni érosion, ni battance

Description




Prof [cm]	Horizons
0 - 50	Brun olive, texture moyenne légère, non calcaire (pH basique), bonne porosité, beaucoup de racines horizontales, très peu de cailloux
50 - 80	Niveau caillouteux d'apport extérieur (Zx) dont briques, chevelus autour des cailloux (35% d'éléments grossiers)
80 - 120	Dépôt sableux sans cailloux, altéré, compact, quelques taches rouille diffuses, fines racines présentes, structure continue à particulaire (sable cohérent)
120 - 150	Moraine de fond "limoneuse" très compacte, calcaire, sans cailloux, sans racines
150 - 155	Eau libre


Schéma



Profil racinaire [nb racines/dm]



Profil hydrique [mm/dm]



Réserve utilisable: 150 mm
 Réserve potentielle totale: 218 mm
 Réserve sur la prof. des racines: 165 mm

Analyses de terre [Sol-Conseil]

Prof [cm]	Argiles [%]	Silts [%]	Sables [%]	MO [%]	pH	CaCO3 tot [%]	Ca act [%]	Fe [ppm]	IPC [%]	Salinité [mg/100g]	CEC [meq/100g]	Ca [%]	Mg [%]	Na [%]	H [%]
20-50	16.4	37.7	45.9	1.5	7.4	0				42.1	69	2.6	4.9	0.9	23
90-120	10.2	24.8	65.0	0.3	8.2	14				70.6	93	0.8	4.8	1.1	0

Synthèse générale

Code cartographique : 9135,2 R

COLLUVIOSOL calcaire, sur sable et moraine compacte, remaniement anthropique, 9135,2-ZX

Description des profils de sol

N° profil: DULLY-01

Localisation

Commune : Dully
Lieu-dit : Bourg d'Amont
Date : 01.03.2001
Observateur : C. Fermond
Position : haut de pente
Pente : 2-5%, régulière

Environnement

Roche mère : moraine de fond compacte
Etat de la roche : moraine "silteuse" très compacte, bariolée, très peu caillouteuse
Hydrologie : excès d'eau temporaire
 ruissellements latéraux, compacité du sous-sol

Antécédents climatiques : pluie et neige faibles les jours précédents

Erosion et battance : ni érosion, ni battance

Etat de surface : enherbé, quelques galets siliceux

Description




Prof [cm]	Horizons
0 - 40	Brun olive, texture moyenne légère, pas de charge grossière (Ls), peu calcaire, porosité moyenne, activité biologique, beaucoup de racines horizontales <i>LAc</i>
40 - 60	Brun olive, texture moyenne (Lsa), calcaire, peu structuré, compact, porosité biologique faible, fines racines encore abondantes et chevelus dans la masse <i>Aca</i>
60 - 80	Moraine compacte bariolée et altérée, très peu poreuse, très compacte, faible enracinement fin (r et ch), quelques accumulations calcaires dans les faces de compression <i>S(g)</i>
80 - 130	Moraine de fond brute, silt très fin, bariolée, très peu explorée par les racines <i>Mca</i>


Schéma



Profil racinaire



Profil hydrique



Réserve utilisable: 120 mm
 Réserve potentielle totale: 200 mm
 Réserve sur la prof. des racines: 163 mm

Analyses de terre [Sol-Conseil]

Prof [cm]	Argiles [%]	Silts [%]	Sables [%]	MO [%]	pH	CaCO3 tot [%]	Ca act [%]	Fe [ppm]	IPC [-]	Salinité [mg/100g]	CEC _m [%]	Ca [%]	K [%]	Mg [%]	Na [%]	H [%]	
20-50	16	42.6	41.4	1.1	7.9	8						38.7	85	2.3	8.1	1.1	3.4
60-100	15.8	57.7	26.5	0.2	8.5	30	9.8	156	4			120.9	95	0.3	3.9	0.7	0

Synthèse générale

Code cartographique : 2413.1

CALCOSOL peu profond sur moraine de fond très compacte, haut de pente, pente faible, 2413.1 -ca

Description des profils de sol

N° profil: DULLY-02

Localisation

Commune : Dully
Lieu-dit : Es Jonchères
Date : 01.03.2001
Observateur : C. Fermond
Position : terrasse suspendue, replat
Pente : 2-5%, régulière

Environnement

Roche mère : fluvio-glaciaire, éléments grossiers > 50-60%
Antécédents climatiques : pluie et neige faibles les jours précédents
Etat de la roche : fluvio-glaciaire sablo-gravelo-caillouteux à passages (lités) de graviers lavés
Hydrologie : sans excès d'eau


Erosion et battance : ni érosion, ni battance
Etat de surface : paillé

Description




Prof [cm]	Horizons	
0 - 65	Brun rougeâtre, texture légère (Sal 15-16% d'argile), charge grossière moyenne, forte porosité, beaucoup de racines	LAc
65 - 85	Brun olive pâle, sablo-caillouteux, très peu calcaire, très poreux, beaucoup de fines racines et chevelus entre les cailloux	S/C
85 - 100	Lit de graviers arrondis purs, avec fines racines	X
100 - 150	Cailloutis sableux (85% d'éléments grossiers), calcaire	Dx


Schéma



Profil racinaire [nb racines/dm]



Profil hydrique [mm/dm]



Réserve utilisable: 82 mm
 Réserve potentielle totale: 89 mm
 Réserve sur la prof. des racines: 86 mm

Analyses de terre [Sol-Conseil]

Prof [cm]	Argiles [%]	Silts [%]	Sables [%]	MO [%]	pH	CaCO3 tot [%]	Ca act [%]	Fe [ppm]	IPC [-]	Salinité [mg/100g]	CECfm [%]	Ca [%]	K [%]	Mg [%]	Na [%]	H [%]
20-50	16.9	30.1	53.0	1.1	7.8	4				47.3	79	2.4	6	1.2	1.2	12
65-85	12.7	11.4	75.9	0.6	8	25	2.4	158	1	43.3	90	1.9	6.3	1.7	1.7	0

Synthèse générale

CALCISOL sur peyrosol, sableux, calcaire

Code cartographique : 2736

Description des profils de sol

N° profil: BURSI-01

Localisation

Commune : Bursins
Lieu-dit : Bursins
Date : 04.04.2001
Observateur : I. Letessier
Position : bas de pente
Pente : 2-5%, régulière

Environnement



Roche mère : colluvions
Antécédents climatiques : fortes pluies (350 mm) dans le mois, pluie faible en cours
Végétation / Cépage : Chasselas / 3309
Erosion et battance : ni érosion, ni battance
Etat de surface : enherbé, profil sur un rang ôté

Description



Prof [cm]	Horizons
0 - 40	Brun sombre, texture moyenne, non calcaire, pH neutre, bien structuré, meuble, beaucoup de racines de toutes tailles, 10% d'éléments grossiers <i>LAc</i>
40 - 80	Horizon brun, un peu plus argileux, non calcaire, très structuré, bien enraciné, non caillouteux <i>Sci</i>
80 - 170	Brun rouge, non calcaire, avec des poches argilo-sableuse et d'abondants cailloux (60%) très altérés (fantômes), à dominante siliceuse, chevelus réticulés dans les pellicules argileuses <i>IIBt</i>
170 - 180	Dépôt glaciaire sablo-caillouteux calcaire, avec quelques chevelus tourmentés <i>IIDx</i>

Schéma

Profil racinaire
[nb racines/dm]Profil hydrique
[mm/dm]

Réserve utilisable: 198 mm
 Réserve potentielle totale: 202 mm
 Réserve sur la prof. des racines: 202 mm

Analyses de terre [Sol-Conseil]

Prof [cm]	Argiles [%]	Silts [%]	Sables [%]	MO [%]	pH	CaCO3 tot [%]	Ca act [%]	Fe [ppm]	IPC [-]	Salinité [mg/100g]	CECfm [%]	Ca [%]	K [%]	Mg [%]	Na [%]	H [%]
10 - 40	17.9	31.8	50.3	1.1	6.9	0				51.4	52	3.9	7.6	0.8	0.8	36
50 - 70	17.6	31.3	51.1	0.8	7.3	0				52.3	63	1.9	6.3	0.9	0.9	29
80 - 100	25.9	27.8	46.3	0.3	7.3	0				62.5	67	0.9	4.2	0.7	0.7	27

Synthèse générale

Code cartographique : 9146 /Z7

Profil complexe de bas de très faible pente, sur "vieux sol" rouge argileux à galets altérés- sain- profond 9146

Description des profils de sol

N° profil: BURSI-02

Localisation

Commune : Bursins

Lieu-dit : St-Vincent

Date : 04.04.2001

Observateur : I. Letessier

Pente : 2-5%, régulière

Environnement

Roche mère : fluvio-glaciaire, éléments grossiers > 50-60%

Antécédents climatiques : fortes pluies (350 mm) dans le mois, pluie faible en cours


Etat de la roche : fluvio-glaciaire sablo-caillouteux très hétérométrique, en très faible longue pente (2%)

Hydrologie : sans excès d'eau

Erosion et battance : ni érosion, ni battance

Description

Prof [cm]	Horizons
0 - 40	Brun rougeâtre sombre, non calcaire, charge grossière modérée (20%), bien structuré, porosité moyenne, meuble <i>L_{Ac}</i>
40 - 80	Brun rougeâtre sombre, bien poreux, non calcaire, peu compact, bien entraciné, caillouteux (40-50%) <i>B_t</i>
80 - 120	Gris jaune pâle, calcaire, très caillouteux, texture légère, fines racines, fins revêtements calcaires autour des racines et galets, galets altérés de micaschiste <i>C_{ca}</i>
120 - 200	Cailloutis (80% d'éléments grossiers) sableux (Sg) bruts, cohérent à compact par endroits, sable calcaire, quelques chevelus atteignent 160cm entre les cailloux <i>D_x</i>

SchémaProfil racinaire
[nb racines/dm]Profil hydrique
[mm/dm]

Réserve utilisable: 130 mm
 Réserve potentielle totale: 135 mm
 Réserve sur la prof. des racines: 135 mm

Analyses de terre [Sol-Conseil]

Prof [cm]	Argiles [%]	Silts [%]	Sables [%]	MO [%]	pH	CaCO ₃ tot [%]	Ca act [%]	Fe [ppm]	IPC [-]	Salinité [mg/100g]	CEC _m [%]	Ca [%]	K [%]	Mg [%]	Na [%]	H [%]
10 - 40	15.8	27.2	57.0	1.4	7.7	2				51.9	70	4.8	8.5	0.7	16	
60 - 80	16.2	28.2	55.6	0.8	7.7	4	2.3			53.1	82	1.5	5.6	1	9.9	
100 - 120	7.8	28.2	64.0	0.2	8.2	30	4.7	179	1.5	67.9	90	1.7	5.6	2.7	0	

Synthèse générale

Code cartographique : 2736

CALCISOL caillouteux sur PEYROSOL, calcaire, profond, très bien ressuyé

Description des profils de sol

N° profil: VINZE-01

Localisation

Commune : Vinzel

Lieu-dit : Blanche Vigne

Date : 04.04.2001

Observateur : I. Letessier

Position : milieu de pente

Pente : 10-15%, régulière

Environnement

Antécédents climatiques : fortes pluies (350 mm) dans le mois, pluie faible en cours

Végétation / Cépage : Chasselas / 3309


Erosion et battance : ni érosion, ni battance

Description




Prof [cm]	Horizons
0 - 55	Brun sombre, texture moyenne, non calcaire (sauf squelette), porosité moyenne, beaucoup de grosses racines horizontales surtout à 50cm, charge grossière modérée (25%) <i>LAc</i>
55 - 130	Brun, texture moyenne légère, très peu calcaire, très poreux (fine porosité tubulaire type loess), mais enracinement fin et en bonne partie mort (?), non caillouteux <i>Sci</i>
130 - 150	Lit de sable caillouteux (40% d'éléments grossiers), calcaire, brun olive pâle, présence de chevelus <i>IIDx</i>
150 - 190	Brun, complexe : alternance de lits de "loess Lsa" et de lits de galets, porosité tubulaire fine, discrets revêtements argileux rougeâtres (horizon d'ancien sol enfoui), peu compact, présence de racines <i>IIMca</i>


Schéma



Profil racinaire [nb racines/dm]



Profil hydrique [mm/dm]



Réserve utilisable: 252 mm
 Réserve potentielle totale: 252 mm
 Réserve sur la prof. des racines: 252 mm

Analyses de terre [Sol-Conseil]

Prof [cm]	Argiles [%]	Silts [%]	Sables [%]	MO [%]	pH	CaCO3 tot [%]	Ca act [%]	Fe [ppm]	IPC [-]	Salinité [mg/100g]	CEC [meq/100g]	Ca [%]	K [%]	Mg [%]	Na [%]	H [%]
10 - 40	19.8	36.9	43.3	0.9	7.8	1					40.9	74	3.9	8.5	1	13
70 - 100	17.1	37.7	45.2	0.5	8.2	7					47.4	94	1.2	3.6	1.1	0

Synthèse générale

Code cartographique : 2135

CALCISOL profond, peu caillouteux, très poreux, de pente modérée, sur loess et sable/cailloux fluvio-glaciaire

Description des profils de sol

N° profil: VINZE-02

Localisation

Commune : Vinzel
Lieu-dit : Trois Carreaux
Date : 04.04.2001
Observateur : I. Letessier
Position : milieu de pente
Pente : 15-25%, régulière

Environnement


Roche mère : moraine sablo-caillouteuse, 30-50% d'éléments grossiers
Etat de la roche : moraine sablo-caillouteuse compacte
Hydrologie : sans excès d'eau
Antécédents climatiques : fortes pluies (350 mm) le mois précédent
Végétation / Cépage : Chasselas / 3309
Erosion et battance : ni érosion, ni battance
Etat de surface : enherbé 1 rang sur 3

Description




Prof [cm]	Horizons	
0 - 40	Brun sombre, calcaire, caillouteux (50% d'éléments grossiers), texture moyenne/légère	L _{Acu}
40 - 80	Brun olive pâle, calcaire, texture moyenne silteuse (L _s), charge grossière irrégulière en lentilles, cailloux/limon jaune, (revêtements bruns, L _{sa} , poreux avec racines localisées autour des cailloux), limite très ondulante (travaux?)	C
80 - 140	Moraine sablo-caillouteuse (70% d'éléments grossiers), calcaire et compacte, très peu de fines racines (mal vues), quelques zones poreuses descendent à 100cm	D _x


Schéma



Profil racinaire [nb racines/dm]



Profil hydrique [mm/dm]



Réserve utilisable: 83 mm
 Réserve potentielle totale: 96 mm
 Réserve sur la prof. des racines: 89 mm

Analyses de terre [Sol-Conseil]

Prof [cm]	Argiles [%]	Silts [%]	Sables [%]	MO [%]	pH	CaCO ₃ tot [%]	Ca [%]	Fe [ppm]	IPC [-]	Salinité [mg/100g]	CEC _m [%]	Ca [%]	K [%]	Mg [%]	Na [%]	H [%]
10-40	19.9	33.0	47.1	1.3	7.9	7				41.7	81	3.9	9.4	0.9	0.9	5.3
60-80	14	50.3	35.7	0.5	8.1	28	5.9	110	4.9	57.1	92	1.7	5.4	1.1	1.1	0

Synthèse générale

Code cartographique : 2114/2115

CALCOSOL moyennement profond, caillouteux, de pente, issu de moraine sablo-caillouteuse, compact, sain

Description des profils de sol

N° profil: VINZE-03

Localisation

Commune : Vinzel
Lieu-dit : Derrière la Maison
Date : 16.03.2001
Observateur : I. Letessier
Position : haut de pente
Pente : 25-35%, régulière

Environnement


Roche mère : moraine alpine sur molasse gréseuse
Etat de la roche : moraine molasso-gréseuse allégée sur banc de grès molassique en place, pente forte (35%)
Hydrologie : sans excès d'eau

Description




Prof [cm]	Horizons	
0 - 40	Brun, texture légère, calcaire, charge grossière moyenne (30%), poreux, très meuble	<i>LAcu</i>
40 - 100	Brun jaunâtre, charge grossière modérée, (très) poreux, meuble	<i>Sca</i>
100 - 130	Brun jaunâtre, léger, calcaire, caillouteux (40% moraine et débris de grès), poreux, meuble à peu compact, présence de grosses racines mortes (ancienne vigne?)	<i>IM</i>
130 - 150	Roche : sable gréseux molassique, gris bleuâtre à traînées rouille, peu dur, en plaques horizontales, tapissées de chevelus	<i>R</i>


Schéma



Profil racinaire [nb racines/dm]



Profil hydrique [mm/dm]



Réserve utilisable: 116 mm
 Réserve potentielle totale: 116 mm
 Réserve sur la prof. des racines: 116 mm

Analyses de terre [Sol-Conseil]

Prof [cm]	Argilles [%]	Silt [%]	Sables [%]	MO [%]	pH	CaCO3 tot [%]	Ca act [%]	Fe [ppm]	IPC [-]	Salinité [mg/100g]	CEC[m [%]	Ca [%]	K [%]	Mg [%]	Na [%]	H [%]
10 - 40	12.5	37.1	50.4	0.6	8.1	14				64.8	88	3	7.7	0.9	0.9	0
60 - 90	15.3	35.1	49.6	0.4	8.2	14				60.1	91	2.3	5.9	0.9	0.9	0

Synthèse générale

Code cartographique : 3115/2115

CALCOSOL, profond de texture légère, très sain, caillouteux, sur molasse gréseuse verdâtre à 130 cm, 3115 ou 2115

Description des profils de sol

N° profil: VINZE-04

Localisation

Commune : Vinzel
Lieu-dit : Les Chaponnières
Date : 04.04.2001
Observateur : I. Letessier
Position : haut de pente
Pente : 15-25%, régulière

Environnement


Roche mère : moraine alpine, 30-50% d'éléments grossiers
Antécédents climatiques : fortes pluies le mois précédent
Etat de la roche : moraine caillouteuse à matrice grise (grésomolassique)
Végétation / Cépage : Chasselas / 3309/Guyot
Hydrologie : sans excès d'eau
Erosion et battance : ni érosion, ni battance
Etat de surface : enherbé, 30% de graviers et cailloux de moraine

Description




Prof [cm]	Horizons
0 - 60	Brun, texture moyenne, 30% d'éléments grossiers, calcaire, meuble, moyennement poreux, structure fine polyédrique, bien enraciné <i>LAc</i>
60 - 100	Brun gris, calcaire, peu caillouteux, texture moyenne, très poreux, taches d'oxydation peu contrastées dans la matrice grise, grains de tuf <i>Sca</i>
100 - 140	Brun jaune pâle, texture moyenne, peu caillouteux, calcaire, poreux (traces de briques), taches rouille dans la matrice grise (lithochrome) <i>C</i>
140 - 160	Gris brun pâle, assez taché de rouille (non fonctionnel, couleur de la molasse?), texture moyenne, caillouteux (50% d'éléments grossiers de moraine), compact, sans racine <i>Dx</i>


Schéma



Profil racinaire [nb racines/dm]



Profil hydrique [mm/dm]



Réserve utilisable: 216 mm
 Réserve potentielle totale: 216 mm
 Réserve sur la prof. des racines: 216 mm

Analyses de terre [Sol-Conseil]

Prof [cm]	Argiles [%]	Silts [%]	Sables [%]	MO [%]	pH	CaCO3 tot [%]	Ca act [%]	Fe [ppm]	IPC [-]	Salinité [mg/100g]	CEC [meq/100g]	Ca [%]	Mg [%]	Na [%]	H [%]
10 - 50	16.2	37.8	46.0	0.9	8	16				42.6	89	2.6	7.2	1.2	0
70 - 100	15.9	44.1	40.0	0.8	8.2	21	8.7	137	4.6	51.6	93	1.4	4.1	1.3	0

Synthèse générale

Code cartographique : 2115
 CALCOSOL, profond, bartolé mais bien ressuyé (lithochrome?)

Description des profils de sol

N° profil: LUINS-01

Localisation

Commune : Luins

Lieu-dit : Capite

Date : 16.03.2001

Observateur : I. Letessier

Position : milieu de pente

Pente : 25-35%, irrégulière

Environnement

Roche mère : moraine de fond compacte

Etat de la roche : moraine de fond de texture en lits variables (La/Lsa/Sg et 30% de cailloux)

Hydrologie : excès d'eau temporaire

ruissellements latéraux, compacité du sous-sol

Antécédents climatiques : fortes pluies dans le mois, pluie faible en cours

Erosion et battance : érosion en ravines

Etat de surface : enherbé/paillé un rang sur deux, 5 à 10% de cailloux de moraine alpine

Description




Prof [cm]	Horizons
0 - 40	Brun, texture moyenne, calcaire, charge grossière moyenne (40%) <i>LAc</i>
40 - 110	Gris pâle à brun jaunâtre, texture moyenne à lourde (limons très fins), calcaire, compact peu poreux, quelques fines racines, taché de rouille et gris dès 40cm, 20 à 25% d'éléments grossiers <i>C</i>
110 - 120	Moraine compacte peu altérée, quelques chevelus morts, couleur grise dominante de réduction du fer, 25% d'éléments grossiers <i>C</i>
120 - 150	Moraine de fond fine très compacte, peu caillouteuse, sans racines <i>Mca</i>
120 - 130	Lit de sable grossier gris, calcaire, trempé <i>C</i>

Schéma




Profil racinaire

[nb racines/dm]



Profil hydrique

[mm/dm]



Réserve utilisable: 114 mm
 Réserve potentielle totale: 182 mm
 Réserve sur la prof. des racines: 137 mm

Analyses de terre [Sol-Conseil]

Prof [cm]	Argiles [%]	Silts [%]	Sables [%]	MO [%]	pH	CaCO3 tot [%]	Ca act [%]	Fe [ppm]	IPC [-]	Salinité [mg/100g]	CEC _{fm} [%]	Ca [%]	K [%]	Mg [%]	Na [%]	H [%]
10-40	16.7	34.2	49.1	1	8	4					41.3	79	3.1	9.6	1.4	7.5
60-80	12.1	43.5	44.4	0.2	8.4	28	6.4	137	3.4		84.3	93	0.7	5.3	1.3	0

Synthèse générale

Code cartographique : 2413,1

CALCOSOL peu à moyennement profond, de pente forte, sur moraine de fond de texture variable 2413,1 x ou 2113,1

Description des profils de sol

N° profil: LUINS-02

Localisation

Commune : Luins
Lieu-dit : Perrailon
Date : 01.03.2001
Observateur : C. Fermond
Position : replat bombé, bosse, échine
Pente : 5-10%, convexe

Environnement

Roche mère : fluvio-glaciaire, éléments grossiers > 50-60%
Antécédents climatiques : pluie faible en cours
Etat de la roche : fluvio-glaciaire sablo-caillouteux lité, en bordure de bourrelet de cône de déjection
Végétation / Cépage : Chasselas / 3309
Hydrologie : sans excès d'eau
Erosion et battance : ni érosion, ni battance
Etat de surface : enherbé et 30 à 40% de galets

Description




Horizons

Prof [cm]
 0 - 50 Brun sombre, texture très légère, charge grossière moyenne (30% d'éléments grossiers), poreux, beaucoup de fines racines
LAc
 50 - 160 Très caillouteux, de toutes tailles, à matrice sableuse calcaire, enracinement très développé autour des cailloux, quelques poches sableuses sans cailloux
Dx


Schéma



Profil racinaire [nb racines/dm]



Profil hydrique [mm/dm]



Réserve utilisable: 64 mm
 Réserve potentielle totale: 67 mm
 Réserve sur la prof. des racines: 67 mm

Analyses de terre [Sol-Conseil]

Prof [cm]	Argiles [%]	Silts [%]	Sables [%]	MO [%]	pH	CaCO3 tot [%]	Ca act [%]	Fe [ppm]	IPC [-]	Salinité [mg/100g]	CECfm [%]	Ca [%]	K [%]	Mg [%]	Na [%]	H [%]
10 - 50	13	31.2	55.8	1.4	7.8	13					46.9	86	2.3	4.9	1	6.3
100 - 150	9.8	25.7	64.5	0.4	8.2	21	4.2	146	2		58.2	90	1.5	6.9	1.3	0

Synthèse générale

Code cartographique : 2715
 ARENOSOL/PEYROSOL calcaire, très filtrant, de fluvio-glaciaire sablo-caillouteux (cône)

Description des profils de sol

N° profil: LUINS-03

Localisation

Commune : Luins
Lieu-dit : Corneaux
Date : 16.03.2001
Observateur : I. Letessier
Position : milieu de pente
Pente : 15-25%, régulière

Environnement

Roche mère : moraine de fond compacte
Etat de la roche : moraine compacte grise, sans cailloux
Hydrologie : excès d'eau temporaire
 ruissellements latéraux, compacité du sous-sol

Antécédents climatiques : pluies les semaines précédentes jusqu'à J-3, 180 mm
Végétation / Cépage : Chasselas / 3309

Description




Prof [cm]	Horizons
0 - 40	Brun sombre, texture moyenne légère, calcaire, charge grossière modérée (20%) <i>LAc</i>
40 - 70	Limon brun olive pâle, peu compact, non caillouteux, un peu lamellaire lité, un peu taché gris/rouille <i>C</i>
70 - 140	Gris jaune pâle bariolé, compact, faces agrégats décolorés en gris, rares fines racines et chevelus à 80-90cm <i>Mca</i>


Schéma



Profil racinaire [nb racines/dm]



Profil hydrique [mm/dm]



Réserve utilisable: 89 mm
 Réserve potentielle totale: 211 mm
 Réserve sur la prof. des racines: 124 mm

Analyses de terre [Sol-Conseil]

Prof [cm]	Argiles [%]	Silts [%]	Sables [%]	MO [%]	pH	CaCO3 [%]	Ca act [%]	Fe [ppm]	IPC [-]	Salinité [mg/100g]	CEC _{fm} [%]	Ca [%]	K [%]	Mg [%]	Na [%]	H [%]	
10 - 40	15.9	34.4	49.7	1.2	8	6						43.4	82	2.8	7.4	1	7.2
60 - 80	19.4	63.8	16.8	0.3	8.3	27	9.5	128	5.8			46.9	93	0.9	4.8	0.9	0

Synthèse générale

Code cartographique : 2413,1

CALCOSOL de texture moyenne, peu profond, de pente, sur moraine de fond non caillouteuse

Description des profils de sol

N° profil: BEGNI-01

Localisation

Commune : Begnins
Lieu-dit : Les Cottés
Date : 16.03.2001
Observateur : I. Letessier
Position : milieu de pente
Pente : 10-15%, régulière

Environnement

Roche mère : moraine sablo-caillouteuse, 30-50% d'éléments grossiers
Antécédents climatiques : neige, pluies
Etat de la roche : moraine alpine à passées sablo-caillouteuses
Végétation / Cépage : Chasselas / 3309/Guyot
Hydrologie : excès d'eau temporaire
Erosion et battance : ni érosion, ni battance
ruissellements latéraux, compacité du sous-sol
Etat de surface : enherbé, trempé

Description




Prof [cm]	Horizons
0 - 55	Brun, très peu calcaire, texture moyenne légère, très poreux, meuble, bien enraciné, 40% de graviers et cailloux calcaires et siliceux <i>LAc</i>
55 - 115	Brun olive à taches peu contrastées, calcaire, texture moyenne légère, poreux (structure et activité biologique), peu compact, fines racines et chevelus verticaux, rares manchons et films de calcite, 40% de graviers et cailloux calcaires et siliceux arrondis <i>Sca</i>
115 - 130	Limon gris calcaire à bariolage assez net, peu poreux, arrêt des dernières fines racines, discrètes accumulations ferromanganiques noires autour des graviers, 20% de graviers calcaires et siliceux <i>Cg</i>
130 - 140	Lit de sable grossier, gris, gros bloc de granite pris dans les couches sableuses (10% d'éléments grossiers) <i>Mca</i>
140 - 160	Lit à 90% de galets, sans terre fine, drainant <i>Mca</i>
160 - 180	Limon gris jaune pâle, sans cailloux, calcaire, trempé <i>Mca</i>

Schéma




Profil racinaire

[nb racines/dm]



Profil hydrique

[mm/dm]



Réserve utilisable: 149 mm
 Réserve potentielle totale: 175 mm
 Réserve sur la prof. des racines: 158 mm

Analyses de terre [Sol-Conseil]

Prof [cm]	Argiles [%]	Silts [%]	Sables [%]	MO [%]	pH	CaCO3 tot [%]	Ca act [%]	Fe [ppm]	IPC [-]	Salinité [mg/100g]	CECfm [%]	Ca [%]	K [%]	Mg [%]	Na [%]	H [%]
10-50	17.5	37.6	44.9	1	7.9	3				44.6	85	1.9	5.1	1.4	1.4	6.7
70-90	17.2	49.1	33.7	0.2	8.3	13				57.6	94	0.7	3.4	1.4	0	0

Synthèse générale

Code cartographique : 2135,1 SX

CALCISOL caillouteux, profond, de pente moyenne, sur moraine caillouteuse à passées de sable grossier 2135,1-SX

Description des profils de sol

N° profil: BEGNI-02

Localisation

Commune : Begnins
Lieu-dit : La Clodiaz
Date : 01.03.2001
Observateur : I. Letessier
Position : haut de pente
Pente : 10-15%, régulière

Environnement

Roche mère : moraine alpine, 30-50% d'éléments grossiers
Antécédents climatiques : neige en cours
État de la roche : très compacte, 30-40% de cailloux-->blocs 30-40 cm
Végétation / Cépage : Chasselas / 3309
Hydrologie : excès d'eau temporaire
Erosion et battance : ni érosion, ni battance
État de surface : enherbé

Description




Prof [cm]	Horizons
0 - 50	Brun, calcaire, trempé, structure fragmentaire peu nette, grosses racines horizontales à 50cm, 30% d'éléments grossiers <i>Laca</i>
50 - 80	Brun plus clair, calcaire, caillouteux (40%), racines plus fines et plus rares, texture moyenne légère, peu compact, humide <i>Aca</i>
80 - 100	Beige olive, calcaire, compact, moraine caillouteuse (40%) peu altérée, quelques chevelus dans les plans de compression de la moraine, parallèles à la pente, taches grises de réduction autour des racines <i>Mca</i>
100 - 180	Moraine compacte beige en place, mal vu car trempé, " effet baignoire", 30% d'éléments grossiers (?) <i>Mca</i>


Schéma



Profil racinaire [nb racines/dm]



Profil hydrique [mm/dm]



Réserve utilisable: 109 mm
 Réserve potentielle totale: 213 mm
 Réserve sur la prof. des racines: 115 mm

Analyses de terre [Sol-Conseil]

Prof [cm]	Argiles [%]	Sables [%]	MO [%]	pH	CaCO3 [%]	Ca act [%]	Fe [ppm]	IPC [mg/100g]	CECfm [%]	Ca [%]	K [%]	Mg [%]	Na [%]	H [%]	
10-30	12.7	35.5	51.8	0.8	8	14				39.4	91	2.5	4.8	2.2	0

Synthèse générale Code cartographique : 2114,1

CALCOSOL moyennement profond, sur moraine caillouteuse compacte de pente, 2114 ou 2115

Description des profils de sol

N° profil: BEGNI-03




Localisation**Environnement**

Commune : Begnins
Lieu-dit : Combe Vallière
Date : 16.03.2001
Observateur : I. Letessier
Position : milieu de pente
Pente : 10-15%, régulière

Roche mère : moraine alpine, 30-50% d'éléments grossiers
Antécédents climatiques : pluie, neige
Etat de la roche : compacte, avec 20-40% de cailloux->blocs mixtes
Hydrologie : excès d'eau temporaire
Erosion et battance : ni érosion, ni battance
Etat de surface : enherbé

Description

Prof [cm]	Horizons
0 - 60	Brun olive, calcaire, texture moyenne silteuse, charge grossière moyenne de graviers (35% d'éléments grossiers), transition très nette <i>LAc</i>
60 - 100	"Silt" olive bariolé, calcaire, humide, poches de sable et graviers localisées, peu poreux, racines fortement raréfiées, horizontales <i>C</i>
100 - 120	Trempé, pierrosité irrégulière de 20 à 40%, compact, bariolage bleuté/rouille, racines extrêmement rares, présence d'un ancien "drain" ? de blocs et gros cailloux", probablement très compact à sec <i>Mca</i>
120 - 140	S'est rempli d'eau, puis éboulé, moraine très compacte probable <i>Mca</i>

Schéma**Profil racinaire**
[nb racines/dm]**Profil hydrique**
[mm/dm]

Réserve utilisable: 99 mm
 Réserve potentielle totale: 130 mm
 Réserve sur la prof. des racines: 114 mm

Analyses de terre [Sol-Conseil]

Prof [cm]	Argiles [%]	Silts [%]	Sables [%]	MO [%]	pH	CaCO3 tot [%]	Ca act [%]	Fe [ppm]	IPC [F]	Salinité [meq/100g]	CeCfm [%]	Ca [%]	K [%]	Mg [%]	Na [%]	H [%]
10-50	13.8	37.2	49.0	1.2	8	10				42.8	89	2.2	6.1	1.1	1.1	2
70-90	11.8	43.0	45.2	0	8.3	21	4.2	139	2.2	61.9	92	1.3	4.9	1.5	1.5	0

Synthèse générale

Code cartographique : 2413,1 DX

CALCOSOL peu profond de pente issu de moraine compacte
 2113,1

Description des profils de sol

N° profil: BEGNI-04

Localisation

Commune : Begnins
Lieu-dit : Fleuri
Date : 01.03.2001
Observateur : I. Letessier
Position : plateau
Pente : plate, régulière

Environnement

Roche mère : fluvio-glaciaire, éléments grossiers > 50-60%
Antécédents climatiques : neige, pluie en cours
Etat de la roche : fluvio-glaciaire de sable grossier calcaire, 70% de galets (→>20 cm)
Végétation / Cépage : Pinot
Hydrologie : sans excès d'eau
Erosion et battance : ni érosion, ni battance
Etat de surface : goutte à goutte

Description




Prof [cm] Horizons

0 - 55 Brun sombre, peu calcaire, texture moyenne légère, charge grossière importante de graviers et cailloux arrondis (+ de 50%) *LAc*
 55 - 65 Horizon discontinu en lentille, peu calcaire, un peu plus argileux et brun rougeâtre *(B)*
 65 - 190 Brun clair, calcaire, sable grossier, graviers et cailloux abondants (80%, arrondis, mixtes), fines racines et chevelus très visibles jusqu'au fond, quelques grosses racines se raréfiant *Dx*


Schéma



Profil racinaire [nb racines/dm]



Profil hydrique [mm/dm]



Réserve utilisable: 69 mm
 Réserve potentielle totale: 69 mm
 Réserve sur la prof. des racines: 69 mm

Analyses de terre [Sol-Conseil]

Prof [cm]	Argiles [%]	Silts [%]	Sables [%]	pH	CaCO3 [%]	Ca act [%]	Fe [ppm]	IPC Salinité [mg/100g]	CeCfm [%]	Ca [%]	K [%]	Mg [%]	Na [%]	H [%]
10-40	20.4	32.2	47.4	1.9	7.9	7	51.0	90	1.3	5.8	0.7	2.5		

Synthèse générale Code cartographique : 2735

PEYROSOL graveleux, peu calcaire, brun rougeâtre sombre, sur sable et cailloux bruts mais bien enracinés à 190 cm

Description des profils de sol

N° profil: BEGNI-05

Localisation

Commune : Begnins

Lieu-dit : Sein-Dené

Date : 01.03.2001

Observateur : I. Letessier

Position : milieu de pente

Pente : 5-10%, régulière

Environnement

Roche mère : moraine jurassienne, 60-70% d'éléments grossiers

Etat de la roche : éléments calcaires jaunes semblant dominés mais moraine pas vue en place

Hydrologie : sans excès d'eau

Erosion et battance :

ni érosion, ni battance

Description




Prof [cm]	Horizons
0 - 50	Brun sombre, calcaire, un peu tassé entre 20 et 40cm, 40% d'éléments grossiers <i>LAc</i>
50 - 80	Brun, bien structuré, très peu calcaire, moyennement poreux, 40% d'éléments grossiers réguliers <i>Sci</i>
80 - 140	Brun, structuré, non calcaire sauf graviers, enracinement assez abondant, charge grossière moyenne (40%) de graviers à blocs, revêtements argileux discrets sur les faces des agrégats et les cailloux <i>Sci</i>


Schéma



Profil racinaire [nb racines/cm]



Profil hydrique [mm/dm]



Réserve utilisable: 158 mm
 Réserve potentielle totale: 158 mm
 Réserve sur la prof. des racines: 158 mm

Analyses de terre [Sol-Conseil]

Prof [cm]	Argiles [%]	Silts [%]	MO [%]	pH	CaCO3 tot [%]	Ca act [%]	Fe [ppm]	IPC [-]	Salinité [mg/100g]	C	N	P	K [%]	Mg [%]	Na [%]	H [%]	
10 - 40	17.8	36.7	45.5	7.8	9				50.6	84	2.2	5.4	0.8	7.3			
80 - 100	22.2	36.1	41.7	7.8	7				44.1	89	2.2	4.7	0.9	3			

Synthèse générale

Code cartographique : 2135 -x(+)

Profil brun, très homogène, peu calcaire en surface, très peu puis pas en profondeur, charge grossière moyenne régulière 2135-x

Description des profils de sol

N° profil: BEGNI-06

Localisation

Commune : Begnins
Lieu-dit : Courson
Date : 16.03.2001
Observateur : I. Letessier
Position : milieu de pente
Pente : 2-5%, régulière

Environnement

Roche mère : moraine jurassienne, 60-70% d'éléments grossiers
Antécédents climatiques : pluie, neige
Etat de la roche : colluvions sur moraine ?, mi pente très faible
Hydrologie : excès d'eau temporaire
Erosion et battance : ni érosion, ni battance
 nappe perchée temporaire

Description




Prof [cm]	Horizons	
0 - 20	Brun sombre, terre fine moyenne légère, non calcaire, trempé, peu graveleux (15%)	LAc
20 - 50	Brun gris, non calcaire, déjà bariolé de rouille et gris, peu contrasté, poreux, peu compact, enracinement moyen plutôt horizontal, 10% d'éléments grossiers	LAc(g)
50 - 70	Texture moyenne, non calcaire, fond gris et bariolé rouille, plus contrasté, peu poreux, fines racines	Scig
70 - 120	Fond gris, à grains jaune, non calcaire, charge grossière moyenne (40% de cailloux de calcaire jaune), bariolé, racines fines vues, mauvais état jusqu'à 110cm	Cg


Schéma



Profil racinaire [nb racines/dm]



Profil hydrique [mm/dm]



■ Réserve non utilisable
 ■ Réserve utilisable

Réserve utilisable: 165 mm
 Réserve potentielle totale: 165 mm
 Réserve sur la prof. des racines: 165 mm

Analyses de terre [Sol-Conseil]

Prof [cm]	Argiles [%]	Silts [%]	Sables [%]	MO [%]	pH	CaCO3 tot [%]	Ca act [%]	Fe [ppm]	IPC [-]	Salinité [mg/100g]	CECfm [%]	Ca [%]	K [%]	Mg [%]	Na [%]	H [%]
10 - 30	17.7	40.0	42.3	1.5	7.6	1				48.0	70	2.9	8.5	1.5	1.5	17
50 - 70	17.3	42.6	40.1	0.8	8	1				39.9	84	2.6	6.2	1.2	1.2	5.7

Synthèse générale

CALCISOL colluvial, profond, rédoxique

Code cartographique : 9135,3

Description des profils de sol

N° profil: BEGNI-07

Localisation

Commune : Begnins
Lieu-dit : Les Grâces
Date : 16.03.2001
Observateur : I. Letessier
Position : bas de pente
Pente : plate, régulière

Environnement

Roche mère : colluvions
Antécédents climatiques : fortes pluies en mars
Hydrologie : excès d'eau permanent
Erosion et battance : dépôts de matériaux
nappe souterraine

Description**Prof [cm]****Horizons**

0 - Profil noyé, dans le tas présence de limon argileux brun noir, non calcaire, taché de rouille, odeur de réduit

Synthèse générale

CALCISOL réductique (localisé)

Code cartographique : 9134.4

Description des profils de sol

N° profil: GLAND-01

Localisation



Commune : Gland
Lieu-dit : Les Sâles
Date : 01.03.2001
Observateur : I. Letessier
Position : haut de pente
Pente : 15-25%, convexe

Environnement

Roche mère : moraine de fond compacte
Antécédents climatiques : neige faible en cours
Etat de la roche : moraine de fond fine très compacte, à plans de compressions / glissements obliques
Végétation / Cépage : Chasselas / 3309?/12ans
Hydrologie : excès d'eau temporaire
Erosion et battance : ni érosion, ni battance
ruissellements latéraux, compacité du sous-sol
Etat de surface : en partie enherbé

Description

Prof [cm]	Horizons
0 - 40	Brun olive pâle, compact, tassé, calcaire, charge grossière modérée, enracinement horizontal, <i>LAc</i>
40 - 80	Moraine brute extrêmement compactée, avec plans de compression/glissement obliques parcourus de chevelus écrasés avec faces décolorées en gris (se réoxyde vite à l'air), 15% d'éléments grossiers <i>C</i>
80 - 100	Idem sans chevelu racinaire, sec <i>Mca</i>

Profil racinaire
[nb racines/dm]**Profil hydrique**
[mm/dm]

Réserve utilisable: 62 mm
 Réserve potentielle totale: 118 mm
 Réserve sur la prof. des racines: 95 mm

Analyses de terre [Sol-Conseil]

Prof [cm]	Argilles [%]	Silts [%]	Sables [%]	MO [%]	pH	CaCO3 tot [%]	Ca act [%]	Fe [ppm]	IPC [-]	Salinité [mg/100g]	CECfm [%]	Ca [%]	K [%]	Mg [%]	Na [%]	H [%]
10-30	13.5	49.5	37.0	0.6	8.2	25	6.7	135	3.7	51.9	89	2.6	7.4	1.1	1.1	0
60-80	15.1	49.2	35.7	0.2	8.5	30	8.5	118	6.1	86.1	91	0.8	7.8	0.6	0.6	0

Synthèse générale

Code cartographique : 2413,1

CALCOSOL très peu profond, sur moraine de fond très compacte, en haut de courte pente convexe

Description des profils de sol

N° profil: GLAND-02

Localisation

Commune : Gland
Lieu-dit : Echelettes
Date : 01.03.2001
Observateur : I. Letessier
Position : milieu de pente
Pente : 5-10%, régulière

Environnement


Roche mère : dépôt glacio-lacustre, sable ou silt glaciaire
Antécédents climatiques : faible neige
Etat de la roche : formation alluviale/glacio-lacustre litée à dominante sableuse et lits de graviers
Végétation / Cépage : Chasselas / 3309/Guyot
Hydrologie : sans excès d'eau
Erosion et battance : ni érosion, ni battance
Etat de surface : enherbé

Description




Prof [cm]	Horizons
0 - 30	Brun, calcaire, texture légère, charge grossière modérée (20%), poreux et bien enraciné <i>LAc</i>
30 - 55	Brun plus clair (mélange), texture moyenne légère, calcaire, poreux, bien enraciné, galets altérés à la base <i>LA</i>
55 - 90	Brun gris, calcaire, dépôts silteux-lamellaire/sableux disposés en lits décimétriques horizontaux avec des lignes de galets, enracinement faible et suivant les alignements compacts (au dessus du limon fin lité) <i>Mca</i>
90 - 160	Gris jaune pâle, calcaire, compact, lits horizontaux de sable fin et moyen, pas de racines, très rares chevelus jusqu'à 110cm, pas de cailloux <i>Mca</i>

Profil racinaire
[nb racines/dm]



Profil hydrique
[mm/dm]



Réserve utilisable: 90 mm
 Réserve potentielle totale: 174 mm
 Réserve sur la prof. des racines: 114 mm

Analyses de terre [Sol-Conseil]

Prof [cm]	Argiles [%]	Silts [%]	Sables [%]	MO [%]	pH	CaCO3 tot [%]	Ca act [%]	Fe [ppm]	IPC [F]	Salinité [mg/100g]	CECfm [%]	Ca [%]	K [%]	Mg [%]	Na [%]	H [%]
10 - 30	14.1	34.6	51.3	1.4	7.7	7				48.9	78	2.4	6.2	0.7	13	
70 - 90	8.1	37.6	54.3	0.1	8.4	23	4.5	114	3.1	77.8	94	1.1	3.8	1.1	0	

Synthèse générale

Code cartographique : 2315

CALCOSOL de texture légère, moyennement profond, sur alluvion litée compacte (limon à sable moyen avec lits de galets)

ANNEXE 2 : ANALYSES DE TERRE SOL-CONSEIL

CODE SOL	PROFIL	Profondeur de prélèvement	cailloux et graviers en	en grammes pour 100g de terre tamisée à 2mm										Fer en ppm	IPC	CEC en meq/100g	K/Mg	K	Cations
				argile	limons fins	limons grossiers	sables fins	sables grossiers	Texture GEPPA	Matière organique	pH	Calcaire Total	Calcaire actif						
2135.1	Beg 01	10-50	29.02	17.50	16.30	21.30	20.00	24.90	LSa	1.0	7.9	3	.	.	10	0.4	1.90		
2135.1	Beg 01	70-90	19.72	17.20	25.50	23.60	17.70	16.00	LSa	0.2	8.3	13	.	.	10	0.2	0.70		
2114.1	Beg 02	10-30	31.07	12.70	15.80	19.70	23.10	28.70	Sal	0.8	8.0	14	.	.	7	0.5	2.50		
2113.1	Beg 03	10-50	25.03	13.80	17.10	20.10	21.70	27.30	Sal	1.2	8.0	10	.	.	8	0.4	2.20		
2113.1	Beg 03	70-90	26.03	11.80	21.00	22.00	20.50	24.70	LSa	0.0	8.3	21	4.2	138.9	2.2	7	0.3	1.30	
2735	Beg 04	10-40	37.10	20.40	16.50	15.70	21.10	26.30	LAS	1.9	7.9	7	.	.	14	0.2	1.30		
2135	Beg 05	10-40	40.43	17.80	19.00	17.70	20.50	25.00	Sal	1.6	7.8	9	.	.	12	0.4	2.20		
2135	Beg 05	80-100	41.91	22.20	19.40	16.70	19.90	21.80	LAS	1.0	7.8	7	.	.	12	0.5	2.20		
9135.3	Beg 06	10-30	11.29	17.70	19.50	20.50	23.50	18.80	LSa	1.5	7.6	1	.	.	12	0.3	2.90		
9135.3	Beg 06	50-70	22.51	17.30	20.60	22.00	22.30	17.80	LSa	0.8	8.0	1	.	.	9	0.4	2.60		
2433.2	Bursinel 1	10-50	8.88	21.90	26.90	16.30	22.00	12.90	LAS	1.0	8.0	1	.	.	10	0.3	1.90		
2433.2	Bursinel 1	60-90	10.23	28.30	47.40	14.80	7.30	2.20	La	0.3	8.3	26	11.8	144.1	6	11	0.1	0.70	
9135,2Z	Bursinel 2	20-50	6.30	16.40	21.30	16.40	30.20	15.70	LSa	1.5	7.4	0	.	.	10	0.5	2.60		
3135,2Z	Bursinel2	90-120	22.52	10.20	13.30	11.50	32.70	32.30	S	0.3	8.2	14	.	.	8	0.2	0.80		
9146	Bursinsu 1	10-40	13.04	17.90	14.70	17.10	24.80	25.50	Sal	1.1	6.9	0	.	.	11	0.5	3.90		
9146	Bursinsu 1	50-70	14.04	17.60	14.50	16.80	24.90	26.20	Sal	0.8	7.3	0	.	.	11	0.3	1.90		
9146	Bursinsu 1	80-100	13.78	25.90	14.40	13.40	24.40	21.90	LAS	0.3	7.3	0	.	.	17	0.2	0.90		
2736	Bursinsu 2	10-40	24.98	15.80	11.60	15.60	23.20	33.80	Sal	1.4	7.7	2	.	.	11	0.6	4.80		
2736	Bursinsu 2	60-80	45.48	16.20	13.00	15.20	23.40	32.20	Sal	0.8	7.7	4	2.3	.	10	0.3	1.50		
2736	Bursinsu 2	100-120	41.71	7.80	11.30	16.90	20.10	43.90	SI	0.2	8.2	30	4.7	178.9	2	6	0.3	1.70	
2413.1	Dully 1	20-50	9.92	16.00	26.00	16.60	25.80	15.60	LSa	1.1	7.9	8	.	.	8	0.3	2.30		
2413.1	Dully 1	60-100	9.53	15.80	39.90	17.80	16.50	10.00	LSa	0.2	8.5	30	9.8	156	4	20	0.1	0.30	
2736	Dully 2	20-50	26.97	16.90	17.80	12.30	20.60	32.40	Sal	1.1	7.8	4	.	.	10	0.4	2.40		
2736	Dully 2	65-85	43.83	12.70	7.80	3.60	10.60	65.30	Sa	0.6	8.0	25	2.4	158.3	1	7	0.3	1.90	
2413.1	Gland 01	10-30	19.34	13.50	29.70	19.80	22.00	15.00	LSa	0.6	8.2	25	6.7	134.8	4	8	0.4	2.60	
2413.1	Gland 01	60-80	15.48	15.10	30.90	18.30	21.80	13.90	LSa	0.2	8.5	30	8.5	118.1	6	13	0.1	0.80	
2315	Gland 02	10-30	26.38	14.10	17.30	17.30	28.00	23.30	Sal	1.4	7.7	7	.	.	10	0.4	2.40		
2315	Gland 02	70-90	12.94	8.10	17.70	19.90	36.20	18.10	SI	0.1	8.4	23	4.5	114.3	3	7	0.3	1.10	
2413.1	Luins1	10-40	25.33	16.70	17.50	16.70	25.50	23.60	Sal	1.0	8.0	4	.	.	9	0.3	3.10		
2413.1	Luins1	60-80	19.70	12.10	24.50	19.00	23.40	21.00	LSa	0.2	8.4	28	6.4	136.9	3	11	0.1	0.70	
2715	Luins2	10-50	37.25	13.00	15.20	16.00	25.90	29.90	Sal	1.4	7.8	13	.	.	9	0.5	2.30		
2715	Luins2	100-150	67.47	9.80	13.70	12.00	23.40	41.10	SI	0.4	8.2	21	4.2	146	2	7	0.2	1.50	
2413.1	Luins 3	10-40	22.56	15.90	17.60	16.80	24.80	24.90	Sal	1.2	8.0	6	.	.	9	0.4	2.80		
2413.1	Luins 3	60-80	3.92	19.40	39.20	24.60	13.10	3.70	La	0.3	8.3	27	9.5	128.1	6	10	0.2	0.90	
2135	Vinzel 01	10-40	23.44	19.80	17.60	19.30	21.10	22.20	LSa	0.9	7.8	1	.	.	10	0.5	3.90		
2135	Vinzel 01	70-100	6.49	17.10	18.50	19.20	24.80	20.40	LSa	0.5	8.2	7	.	.	9	0.3	1.20		

ANNEXE 3 : REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DE QUELQUES SOLS

ANNEXE 3 - REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES PROFILS DE SOLS
Zone pilote de La Côte





Planche 3

ANNEXE 4 : QUELQUES PROFILS HYDRIQUES



ANNEXE 5 : MÉTHODOLOGIE DE CALCUL DE LA RÉSERVE HYDRIQUE

Calculs et présentation schématique de profils hydriques et racinaires

Sigales - Etudes de Sol et de Terroirs I. Letessier C. Fermond

La variabilité des réserves hydriques des sols viticoles peut s'échelonner entre 40 et 300 mm. Pour prendre en compte cette variabilité, il est préférable de choisir une méthode qui permette de réaliser rapidement un nombre élevé d'observations. Souvent profonds, caillouteux ou rocheux, ces sols se prêtent mal à des caractérisations précises, qui ne sont évidemment pas exclues.

Un outil de calcul et de représentation rapide a donc été mis au point. Utilisée depuis 1999 dans le cadre des études de terroirs, cette méthode permet une bonne représentation de la notion de réserve hydrique, fondamentale dans la compréhension des terroirs viticoles. Accompagnée d'un schéma de description, cette représentation permet de mémoriser facilement les grandes caractéristiques des sols et leur interprétation (Fig. 1). Cet outil permet par ailleurs de visualiser rapidement la répartition et la quantité d'eau utile dans le sol.

Calcul de la réserve utile

$$RU \text{ (en mm d'eau)} = PU * Te * (1 - Cx)$$

PU : profondeur utilisée

Te : coefficient textural (sable grossier:0.5 à silt argileux sain: 2)

(1 - Cx) : pondération du taux de graviers / cailloux




Fig. 1 : Calcul de la réserve utile

Le préalable est bien évidemment l'ouverture d'un profil pédologique "en situation", étape essentielle en matière d'explication et de raisonnement, qui ne peut être remplacée par aucune mesure indirecte.


Principes de calcul

Le calcul se fait par tranche fixe de 10 cm pour s'affranchir de la notion d'horizons d'épaisseurs variables et permettre d'intégrer des variations rapides de texture, pierrosité, etc. (Tab. 1).

Paramètres du sol			Paramètres racinaires				Zone de calcul				
Profondeur	Texture	Pierrosité	Gr Rac	Rac/rad	ch	coef Rac	Coef. T	Réserve Utilisab	Réserve non	R totale	cumulés (50cm)
0-10	lsa	25%				1,00	1,6	12,00	-	12,00	12
20-30	lsa	25%				1,00	1,6	12,00	-	12,00	24
20-30	lsa	25%	8			1,00	1,6	12,00	-	12,00	36
30-40	lsa	20%	6			1,00	1,6	12,80	-	12,80	48,8
40-50	lsa	20%		18	8	1,00	1,6	12,80	-	12,80	62
50-60	lsa	15%		18	8	1,00	1,6	13,60	-	13,60	13,60
60-70	las	15%		2	8	1,00	1,75	14,88	-	14,88	28,475
70-80	las	15%			2	1,00	1,75	14,88	-	14,88	43,35
80-90	las	15%			2++	1,00	1,75	14,88	-	14,88	58,225
90-100	ls	15%			4++	1,00	1,2	10,20	-	10,20	68
100-110	s	15%			6++	1,00	1	8,50	-	8,50	8,5
110-120	ls	50%			7++	1,00	1,2	6,00	-	6,00	14,5
120-130	s	30%			7++	1,00	1	7,00	-	7,00	21,5
130-140	sl	50%			7++	1,00	1,1	5,50	-	5,50	27
140-150	sg	70%			4+	1,00	0,5	1,50	-	1,50	29
150-160	ls	30%			4+	1,00	1,2	8,40	-	8,40	8,4
160-170	l	50%			2(+)	0,50	1,75	4,38	4,38	8,75	12,775
170-180	ls	50%			2(+)	0,50	1,2	3,00	3,00	6,00	15,775
180-190	Sg	40%				0,10	0,5	0,30	2,70	3,00	16,075
190-200	Sg	10%				-	0,5	-	4,50	-	16
200-210						-	0	-	-	-	-
210-220						-	0	-	-	-	-
220-230						-	0	-	-	-	-

Tab. 1 : Exemple de feuille de calcul : entrée des données de texture, de pierrosité et de colonisation racinaire

Pour chaque tranche de sol, il faut noter la texture (Tab. 2), puis le pourcentage de cailloux et graviers (Fig. 2 et 3), puis les comptages racinaires et enfin un coefficient de colonisation racinaire (Tab. 3).



Tab. 2 : Tableau des coefficients texturaux utilisés




Fig. 2 : Estimation de la pierrosité

Si l'on procède par pesée pour les éléments grossiers, il faut transformer le pondéral en volumique, car les cailloux sont plus denses que la terre fine. C'est surtout notable pour les pierrosités moyennes. On peut utiliser l'abaque suivant (écarts maximum de 15% pour des horizons de profondeur assez denses, 20 % pour des horizons de surface peu denses).




Fig. 3 : Abaque poids-volume pour les éléments grossiers

Tab. 3 - Coefficients de colonisation racinaire

- 1 = bonne répartition, densité correcte
- 0,5 = faible densité ou mal réparties (grosses zones sans racines)
- 0,1 = juste quelques chevelus ou fines racines, parfois en mauvais état
- 0 = aucune racine vue

Ces coefficients sont applicables à des vignes d'un certain âge, avec enracinement bien en place.

Le calcul automatique des réserves et la représentation instantanée des graphes racinaires et hydriques peuvent se faire rapidement par une application informatique simple (Fig. 4).




Fig. 4 : Représentation graphique des profils racinaires et hydriques

La zone orangée du profil hydrique correspond à un volume pouvant s'humidifier mais non colonisé par les racines. Un bleu plus clair peut être affecté aux zones très sableuses (moindres déplacements capillaires). Des figurés peuvent être ajoutés sur la figure pour signaler une difficulté (arrivées d'eau, rocher en plaque, etc.) ou une forte probabilité de poursuite au-delà de la tranche observée.

Commentaire

Les causes d'erreurs proviennent plus de l'estimation de la profondeur effectivement utilisée et de l'estimation de la pierrosité que de la précision des coefficients texturaux choisis, surtout dans les horizons de fortes pierrosités, fréquents pour les sols viticoles. Par exemple, passer de 70% à 90% de cailloux, c'est passer de 30 à 10% de terre fine et diminuer par 3 la réserve hydrique.

Le choix a été fait de se limiter à l'observation et aux calculs standards, sans introduire de coefficients correctifs plus ou moins validés, bien que l'on puisse en imaginer de nombreux. Cette simplicité voulue n'empêche pas de formuler des commentaires et des hypothèses. Par exemple la pierrosité peut être poreuse, altérée ou encore arrangée selon une architecture serrée qui permet un certain stockage d'eau. Ainsi, le "bulbe" de consommation que l'on peut dessiner autour d'une racine de profondeur est de taille très variable selon la texture et la qualité des enrobages colloïdaux autour des sables et des éléments grossiers. Pour les très fortes pierrosités de profondeur à matrice non sableuse, on observe une sous-estimation systématique de la réserve lors des validations par le comportement de la plante (mesures de potentiel hydrique) ou plus simplement lors de discussion avec les vignerons. Il est probable que les remontées capillaires à partir de la profondeur s'effectuent sur plusieurs décimètres

ANNEXE 6 : CARTE DES SOLS GRAND FORMAT

La carte des sols grand format, à l'échelle 1:7071, est indissociable du présent rapport. Elle est éditée séparément.