

# Hypertrophie racinaire du colza : poser le bon diagnostic

## Hernie des crucifères ≠ charançon gallicole

	Maladie tellurique Hernie des crucifères	Ravageur secondaire Charançon gallicole
		
<b>Différentiation</b>	Intérieur de la galle est plein, compact, parfois un peu spongieux, mais jamais creux	Intérieur de la galle avec présence de galeries et/ou de larves
<b>Nuisibilité</b>	 En cas de forte infestation	
<b>Symptômes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Déformation et renflement des racines</li> <li>- Flétrissement ou sénescence du feuillage</li> <li>- Rougissement des plantes infestées</li> <li>- Défaut de croissance</li> <li>- Disparition des plantes (forte infestation)</li> <li>- Pourrissement des racines</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Galle(s) au niveau du collet</li> <li>- Aucun impact sur le développement du colza et sur le rendement</li> </ul>
<b>Leviers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semer des variétés tolérantes (Cromat)</li> <li>- Chaulage</li> <li>- Délais de retour allongé</li> <li>- Eviter les intercultures à base de crucifère</li> <li>- Nettoyage des équipements réguliers et avec minutie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La lutte ne se justifie pas</li> </ul>

## Ressources utiles

- Les conseillers de l'équipe production végétal répondent à vos questions au 024 423 44 88.

